

鶉科鳥類辨識

小撇步

Part.2

整理／楊玉祥

隨著分類系統的研究更新，我們熟知的藍磯鶉、黃尾鶉、藍尾鶉…等，許多從前歸類於鶉科的鳥種，現在是鶉科的了！除了栗背林鶉、小剪尾、白尾鶉…等少數為留鳥，主要出現於山區、溪澗地帶之外，大多數都是隨著秋、冬季節到來，而過境台灣或前來度冬的候鳥，其中，有許多美麗的鳥種，如：野鶉、日本歌鶉、黃尾鶉、藍尾鶉…等，鳥友們可得把握機會到各地（如過境鳥聖地-南星計畫區）尋覓牠們的蹤影！我們整理了一些辨識的方法，提供給大家參考。



藍磯鶉（王健得 攝）

鶉科 MUSCICAPIDAE Part 2 鶉及藍磯鶉（原本歸於鶉科）		
藍磯鶉 <i>Monticola solitarius</i> Blue Rock Thrush	<ul style="list-style-type: none"> • 雄鳥背面深藍色，翼及尾羽黑色、並有藍色細邊。台灣有記錄 2 個亞種 <i>M. s. philippensis</i> 較常見，下胸至尾下覆羽栗褐色；另一種亞種 <i>M. s. pandoo</i> 全身都為深藍色。 • 雌鳥全身大致褐色，背面較深，腹部密佈，頰至胸有鱗狀斑，腹以下有橫紋。 	<ul style="list-style-type: none"> • 普遍冬候鳥。常出現於平地至中海拔的空曠地帶，喜站立於屋頂或其他突出物上，又名「厝角鳥」。停棲時常上下擺動尾羽。
中、小型，體長約 14-16cm，體暗色，出現於山區溪流、停棲時常張合、上下擺動尾羽		
鉛色水鶉 <i>Rhyacornis fuliginosa</i> Plumbeous Water Redstart	<ul style="list-style-type: none"> • 體鉛灰色。雄鳥尾上、下覆羽及尾羽栗褐色。 • 雌鳥背面略帶褐色，翼及尾羽暗褐色，尾上覆羽白色。腹部暗灰色有細白斑。 	<ul style="list-style-type: none"> • 普遍的特有亞種。 • 是山區溪流附近最常見的鳥種之一。
白尾鶉 <i>Myiomela leucura</i> White-tailed Robin	<ul style="list-style-type: none"> • 嘴黑色、腳淡色。全身大致黑白對比，甚醒目：頭至背、胸為黑色，翼黑色、有白斑，尾羽黑色，外側白色；額、腰至尾上覆羽、腹以下白色。飛行時翼有白色寬帶。 	<ul style="list-style-type: none"> • 不普遍的特有亞種。 • 通常單獨或成對出現於山區清澈的溪流附近。
小剪尾 <i>Enicurus scouleri</i> Little Forktail	<ul style="list-style-type: none"> • 雄鳥全身大致黑藍色、有光澤，尾上覆羽、尾羽黑色，外側尾羽基部白色形成 2 塊大白斑。 • 雌鳥全身大致褐色，尾羽白斑似雄鳥。 	<ul style="list-style-type: none"> • 單獨出現於中、低海拔的溪流及樹林底層地帶。喜發出似「咪-哆雷咪」的叫聲。
中型，體長約 15cm，背面紅褐色或黃褐色，無眉線		
日本歌鶉 <i>Luscinia akahige</i> Japanese Robin	<ul style="list-style-type: none"> • 背面大致為黃褐色，臉至胸為橘黃色，下胸、脇暗灰色，腹以下污白色。 • 雌鳥似雄鳥，顏色較暗淡。 	<ul style="list-style-type: none"> • 稀有冬候鳥或迷鳥。中北部較常見，南部僅南星計畫區有過記錄(洪福龍等，2008)
琉球歌鶉 <i>Luscinia komadori</i> Ryukyu Robin	<ul style="list-style-type: none"> • 背面大致為紅褐色。 • 雄鳥自眼以下至喉、胸部為黑色，以下白色、脇有黑斑。雌鳥眼以下全污白色，胸、脇較暗色。 	<ul style="list-style-type: none"> • 迷鳥，記錄甚少。
紅尾歌鶉 <i>Luscinia sibilans</i> Rufous-tailed Robin	<ul style="list-style-type: none"> • 背面大致為暗褐色，翼、腰至尾羽棕紅色。 • 喉、胸及腹側褐色，有暗色細鱗狀斑。 	<ul style="list-style-type: none"> • 迷鳥，記錄甚少。

中型，體長約 15-17cm，背面褐色，眉線黃白色、有顎線，喉白色或帶紅色、藍色		
藍喉鳴 <i>Luscinia svecica</i> Bluethroat	<ul style="list-style-type: none"> 背褐色、有不明顯的暗縱斑，外側尾羽基部紅色，腹面白色。雄鳥顎線藍色、喉白色，下喉至胸有紅、藍、黑、白及紅褐色橫帶、脇褐色。雌鳥顎線黑褐色，胸有黑褐色縱斑。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
野鳴 <i>Luscinia calliope</i> Siberian Rubythroat	<ul style="list-style-type: none"> 全身大致褐色，腹以下白色。眉斑及頰黃白色。 雄鳥眼先及顎線黑色，喉紅色。雌鳥眼先及顎線為褐色、喉部通常為白色，亦有喉部橙紅色之雌鳥，但顏色不如雄鳥的紅艷，橙紅色塊的面積亦較小。 	<ul style="list-style-type: none"> 不普遍冬候鳥，出現於平地至低海拔的草原和農耕地環境。善鳴，常於清晨發出婉轉、悅耳之叫聲。
中型，體長約 15cm，背面暗藍色（雄）／背面褐色、尾羽部份藍色（雌）		
藍歌鳴 <i>Luscinia cyane</i> Siberian Blue Robin	<ul style="list-style-type: none"> 嘴黑色、腳淡色。雄鳥背面暗藍色、腹面白色，眼先、顎線至胸側有黑線。雌鳥背面大致褐色、尾羽基部帶藍色，喉、胸及脇污白色，腹中央至尾下白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
藍尾鳴 <i>Luscinia cyanura</i> Orange-flanked Bush Robin	<ul style="list-style-type: none"> 嘴、腳黑色。雄鳥背面暗藍色，眉線白色。腹面大致白色，胸側及脇橙黃色。雌鳥背面大致褐色、腰至尾羽暗藍色、眼周圍白色。腹面大致污白色、脇橙黃色。 	<ul style="list-style-type: none"> 不普遍冬候鳥，常出現於海岸附近至中海拔樹林、草叢地。停棲時常擺動尾羽。



中、小型，體長約 14-19cm，背面黑色或暗灰色		
白眉林鳴 <i>Luscinia indica</i> White-browed Bush Robin	<ul style="list-style-type: none"> 背暗灰色，眉線粗、白色甚醒目，腹面褐色，腹中央白色，尾下覆羽黃褐色。雌鳥背面較偏褐色，腹面顏色較暗。 	<ul style="list-style-type: none"> 稀有特有亞種。分布於中高海拔的樹林底層或灌叢。
栗背林鳴 <i>Luscinia johnstoniae</i> Collared Bush Robin	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥背面黑色，肩羽橙紅色、與頸環相連，眉斑粗、白色甚醒目。腹腹面褐色，腹中央及尾下覆羽白色。 雌鳥背面暗灰褐色，白色眉斑較細，胸至脇暗褐色。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣特有種，普遍。 分布於中、高海拔的樹林底層或灌叢中。
赭紅尾鳴 <i>Phoenicurus ochruros</i> Black Redstart	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥頭至背、胸黑色，腰至尾羽栗紅色，中央尾羽黑色。腹面胸以下為栗紅色。 雌鳥頭至背部、腹面褐色。尾部特徵似雄鳥。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
黃尾鳴 <i>Phoenicurus aureus</i> Daurian Redstart	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥頭頂銀灰色、前頭、頭側至後頭灰白。臉至背、翼黑色、翼有大白斑，腰至尾紅褐色、中央尾羽黑褐色。腹橙褐色。雌鳥頭至背部、腹面褐色、眼圈白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 不普遍冬候鳥。單獨出現於平地至中海拔之樹林、空曠草原或灌叢地帶。
白頂溪鳴 <i>Chaimarrornis leucocephalus</i> White-capped Water Redstart	<ul style="list-style-type: none"> 額、頭頂至後頭白色，臉至背部、胸黑色，腰以下、腹面栗褐色、尾羽末端黑色。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。高雄地區曾經於茂林地區有過 1 筆記錄（林昆海，1999 年）。

中、小型，體長約 14-16cm、嘴、腳黑色，背面灰褐色或黃褐色，腳略長，主要在地面活動，站姿較直挺		
沙鷗 <i>Oenanthe isabellina</i> Isabelline Wheatear	<ul style="list-style-type: none"> 背面大致黃褐色，尾上覆羽至尾羽基部白色、尾羽末端有大塊黑斑紋。 眉斑白色、眼先黑色，喉白色，胸橙色、以下污白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
穗鷗 <i>Oenanthe oenanthe</i> Northern Wheatear	<ul style="list-style-type: none"> 背面大致灰褐色、翼、尾羽末端黑色，眉斑白色，過眼線粗黑甚明顯，喉至胸橙黃色、以下污白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
漠鷗 <i>Oenanthe deserti</i> Desert Wheatear	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥全身大致黃褐色，翼、尾羽末端黑色。眉斑白色，臉至喉、胸側與翼黑色相連。 雌鳥背面灰褐色，腰白色，翼暗色、羽緣淡色，腹面大致黃褐色，眉斑淡色、過眼線黑色細長。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
其他		
黑喉鷗 <i>Saxicola torquatus</i> Common Stonechat	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥繁殖羽大致黑白對比：背面黑色，肩羽有白斑，腰、頸側、腹面白色，胸有橙褐色大型斑塊。非繁殖羽全身大致黃褐色，尾羽黑色。 雌鳥大致黃褐色，頭、背部、翼有暗色斑紋，翼有白斑，腰橙褐色，尾羽黑色。眉線及喉部白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 稀有過境鳥，通常單獨出現於海岸附近的樹林、草叢等環境。
灰叢鷗 <i>Saxicola ferreus</i> Grey Bushchat	<ul style="list-style-type: none"> 雄鳥背面暗灰色，有縱斑，翼有白斑，尾黑色、外側白色，臉黑色，眉線、喉白色。腹中央至尾下覆羽白色。 雌鳥全身大致黃褐色，背、翼有暗色縱斑，腰橙褐色，尾黑色、外側褐色。臉紅褐色，眉斑黃褐色、喉白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 迷鳥，記錄甚少。
鵲鷗 <i>Copsychus saularis</i> Oriental Magpie-Robin	<ul style="list-style-type: none"> 中型約 20cm。雄鳥背面大致黑色，翼有長條形白斑，外側尾羽、腹面胸以下白色。雌鳥身上黑色部分均為白色。 	<ul style="list-style-type: none"> 稀有過境或冬候鳥。在金門、馬祖地區為普遍留鳥。

新、舊版台灣鳥類名錄更動整理

隨著賞鳥及鳥類攝影愛好者的增加，台灣不斷地記錄到新記錄種，再加上鳥類分類系統之更動，原有之台灣鳥類名錄已有重新檢討之必要，因此中華鳥會鳥類記錄委員會於 2008 年 12 月 29 日審定出新版鳥類名錄。新版名錄共登錄 560 種自然出現之鳥種，涵蓋範圍包括台灣本島及其鄰近附屬島嶼，如澎湖群島、蘭嶼、綠島、金門列島、馬祖列島、東沙群島、南沙群島及花瓶嶼、彭佳嶼、棉花嶼等地。由於新增許多鳥種，再加上鳥類分類系統更動，特整理出新舊版名錄間不同之處供鳥友參考。*科別排列依 2008 年新版名錄之順序，僅列出有更動之科別*

科別	新增鳥種	新版刪除的鳥種、更名或其他變動
雉科	鸚鵡	
雁鴨科	樹鴨、小白額雁、加拿大雁、黑雁、疣鼻天鵝、黃嘴天鵝、棉鴨、赤嘴潛鴨、鵝鴨。鵝更名為小天鵝	
增列潛鳥科	含紅喉潛鳥、黑喉潛鳥。	
增列信天翁科	含黑背信天翁、黑腳信天翁、短尾信天翁	
水雉鳥科	白腹穴鳥	
海燕科	褐翅叉尾海燕	
鸛鷗科	赤頸鸛鷗	
朱鷺科	朱鷺、彩鷺	改稱鸛科
鷺科	棕夜鷺、爪哇池鷺、白頸黑鷺、白臉鷺	
鵝鷓科	卷羽鵝鷓	刪除灰鵝鷓
鰲鳥科	藍臉鰲鳥、紅腳鰲鳥	
鸕鷀科	海鸕鷀	

科別	新增鳥種	新版刪除的鳥種、更名或其他變動
隼科	紅腳隼	
鷹科	黑冠鵟隼、黑翅鳶、栗鳶、白腹海鵟、大鵟。魚鷹併入鷹科，刪除鵟科。蜂鷹改東方蜂鷹；澤鳶改東方澤鵟	
秧雞科	紅腳秧雞、紅腳苦惡鳥、斑胸田雞、斑脇田雞、紫水雞	
鶴科	蓑羽鶴、白枕鶴、丹頂鶴	
三趾鶉科	黃腳三趾鶉	
長腳鶉科		反嘴鶉科改稱長腳鶉科
鶉科	美洲金斑鶉	金斑鶉改太平洋金斑鶉；紅胸鶉改東方紅胸鶉
鶉科	大地鶉、美洲尖尾濱鶉、高蹺濱鶉、黃胸鶉	
鶉科	黃腳銀鶉、灰背鶉、小黑背鶉、漁鶉、棕頭鶉、笑鶉、弗氏鶉、小鶉、白嘴端燕鶉、黑嘴端鳳頭燕鶉、白腰燕鶉	黑脊鶉改稱銀鶉；海鶉學名改 <i>Larus canus</i>
賊鶉科	灰賊鶉、中賊鶉、長尾賊鶉	賊鶉改稱短尾賊鶉
海雀科	崖海鴉、扁嘴海雀	
鳩科	灰斑鳩、斑尾鵲鳩、橙胸綠鳩、小綠鳩	
杜鵑科	棕腹杜鵑、四聲杜鵑、八聲杜鵑、烏鵑、噪鵑、褐翅鴉鵑	
草鴉科		草鴉學名改 <i>Tyto capensis</i> 。
鴉科	東方角鴉、縱腹紋小鴉	刪除角鴉 <i>Otus scops</i> 。
雨燕科	灰喉針尾雨燕	針尾雨燕改稱白喉針尾雨燕
翠鳥科	白領翡翠、三趾翠鳥、斑翡翠	
增列蜂虎科	包含栗喉蜂虎、彩虹蜂虎、栗頭蜂虎	
鬚鴉科	五色鳥改名台灣擬啄木，學名改 <i>Megalaima nuchalis</i> ，地位提昇至特有種	
山椒鳥科	黑原鵲鵙、小灰山椒鳥、長尾山椒鳥	
伯勞科	虎紋伯勞、楔尾伯勞	
卷尾科	髮冠卷尾	
王鶉科	亞洲壽帶	綬帶鳥改稱紫壽帶
鴉科	東方寒鴉、家烏鴉、小嘴烏鴉、玉頸鴉	刪除寒鴉
連雀科	黃連雀	
山雀科	白頰山雀	
燕科	金腰燕	毛腳燕改稱東方毛腳燕，學名改 <i>Delichon dasypus</i>
百靈科	大短趾百靈、亞洲短趾百靈、歐亞雲雀	
新增扇尾鶯科	棕扇尾鶯、黃頭扇尾鶯、斑紋鶯、灰頭鶯、褐頭鶯改列此科	
鶯科	小蝗鶯、史氏蝗鶯、東方大葦鶯、細紋葦鶯、稻田葦鶯、歐亞柳鶯、巨嘴柳鶯、雙斑綠柳鶯、庫頁島柳鶯、飯島柳鶯、冠紋柳鶯、黑眉柳鶯、白喉林鶯、漠地林鶯。／刪除大葦鶯；褐色叢樹鶯改稱台灣叢樹鶯	
畫眉科	大陸畫眉	刪除鸚嘴科，粉紅鸚嘴、黃羽鸚嘴改列畫眉科
繡眼科	低地繡眼	
新增戴菊科	戴菊鳥、火冠戴菊鳥改列戴菊科	
八哥科	黑領棕鳥、粉紅棕鳥	棕鳥科改稱八哥科
鶉科	白斑紫嘯鶉、白氏地鶉、赤頸鶉。斑點鶉 <i>Turdus naumanni</i> 分為紅尾鶉 <i>Turdus naumanni</i> 及斑點鶉 <i>Turdus eunomus</i>	虎鶉改稱虎斑地鶉
鶉科	新增紅尾歌鶉、鶉鶉、白頂溪鶉、沙鶉、漠鶉、穗鶉、白喉磯鶉、白喉林鶉、斑鶉、褐胸鶉、白眉鶉、銅藍鶉、方尾鶉。／日本歌鶉、琉球歌鶉、藍喉鶉、野鶉、藍歌鶉、白眉林鶉、栗背林鶉、藍尾鶉、赭紅尾鶉、鉛色水鶉（原名鉛色水鶉）、黃尾鶉、白尾鶉、小剪尾、黑喉鶉、灰叢鶉、藍磯鶉併入此科	
增列吸蜜鳥科	包含叉尾太陽鳥	
增列麻雀科		山麻雀、麻雀改列麻雀科
岩鶉科	棕眉山岩鶉	
鶉科	黃頭鶉、日本鶉、布萊氏鶉、黃腹鶉	小水鶉改稱水鶉，大花鶉學名改 <i>Anthus richardi</i>
雀科	普通朱頂雀	
鶉科	白頭鶉、草鶉、灰鶉、鐵爪鶉、雪鶉	