

鶇科鳥類辨識

小撇步

整理／楊玉祥

鶇科鳥類中，除了台灣紫嘯鶇為特有種，白頭鶇、小翼鶇為特有亞種，虎斑地鶇（虎鶇）為稀有留鳥及不普遍冬候鳥外，其餘均為冬候鳥。另外金門地區黑鶇為留鳥，而馬祖則有白斑紫嘯鶇。鶇科活動於樹林中層，亦會下到樹林底層覓食，習性十分機警。茲將常見的鶇科外觀特徵比較整理如下，以供鳥友們參考。

種類	外型特徵比較	居留狀態
小翼鶇 White-browed Shortwing <i>Brachypteryx montana</i>	體長只有 13cm，全身大致褐色，有白色粗短眉斑；分布於中高海拔濃密草叢及樹林底層；習性隱密，常常只聞其聲，不見其影。	特有亞種
虎斑地鶇（虎鶇） Scaly Thrush <i>Zoothera dauma</i>	全身黃褐色，密布黑色鱗狀斑紋。	稀有留鳥及不普遍冬候鳥
通體藍黑色，有光澤；生活於溪流及臨近的森林		
台灣紫嘯鶇 Taiwan Whistling Thrush <i>Myophonus insularis</i>	無白斑	台灣特有種
白斑紫嘯鶇 Blue Whistling Thrush <i>Myophonus caeruleus</i>	<u>頭、頸及胸部有細白斑</u>	馬祖地區之留鳥
背面黑色或全身黑色		
白眉地鶇♂ Siberian Thrush <i>Zoothera sibirica</i>	全身黑色， <u>有白色粗眉線</u>	稀有過境鳥
烏灰鶇♂ Japanese Thrush <i>Turdus cardis</i>	<u>嘴黃色</u> ， <u>眼圈黃色</u> ， <u>腹部白色</u> <u>有黑色斑點</u>	稀有過境鳥
黑鶇 Eurasian Blackbird <i>Turdus merula</i>	全身黑色， <u>嘴橙黃色</u> ， <u>眼圈黃色</u>	稀有冬候鳥，在金門及馬祖為留鳥



背面褐色，腹面有明顯的褐色		
白眉地鸫♀ Siberian Thrush <i>Zoothera sibirica</i>	眉線白色，腹面黃褐色，密布淡色斑點	稀有過境鳥
白腹鸫 Pale Thrush <i>Turdus pallidus</i>	胸至脇灰褐色，腹部淡色	普遍冬候鳥
斑點鸫 Dusky Thrush <i>Turdus eunomus</i>	眉線、腮線及喉白色，腹面有暗色大型斑點	普遍冬候鳥
背面褐色或灰色，腹面淡色有明顯的橙紅色或栗紅色		
赤腹鸫 Brown-headed Thrush <i>Turdus chrysolaus</i>	背面褐色，腹面淡色，脇及腹側橙紅色	普遍冬候鳥
灰背鸫 Grey-backed Thrush <i>Turdus hortulorum</i>	背面灰色，腹面淡色，脇及腹側橙紅色	稀有過境鳥
白眉鸫 Eyebrowed Thrush <i>Turdus obscurus</i>	♂：頭灰色至頸灰色，眉線、嘴基及腮線白色，背褐色，腹面淡色，脇及腹側橙紅色 ♀：頭與背褐色，眉線白色	普遍冬候鳥
烏灰鸫♀ Japanese Thrush <i>Turdus cardis</i>	嘴黃色，背面褐色，腮線及喉白色，腹面淡色，胸側及脇橙紅色有黑色粗斑點	稀有過境鳥
白頭鸫 Island Thrush <i>Turdus poliocephalus</i>	♂：頭至頸白色，背面栗褐色，腹面栗紅色。♀：頭頂至背面褐色，眉線白色，臉白色有細斑點，腹面暗橙褐色	特有亞種
紅尾鸫 Naumann's Thrush <i>Turdus naumanni</i>	背面褐色，外側尾羽紅褐色，腹面淡色，密布橙紅色大斑點	稀有冬候鳥
背面褐色，腹面有明顯的褐色		
白眉地鸫♀ Siberian Thrush <i>Zoothera sibirica</i>	眉線白色，腹面黃褐色，密布淡色斑點	稀有過境鳥
白腹鸫 Pale Thrush <i>Turdus pallidus</i>	胸至脇灰褐色，腹部淡色	普遍冬候鳥
斑點鸫 Dusky Thrush <i>Turdus eunomus</i>	眉線、腮線及喉白色，腹面有暗色大型斑點	普遍冬候鳥

