

# 雀科、連雀科鳥類辨識

## 小撇步



黃山雀 · 李文化 攝

## 山雀科、長尾山雀科

整理 / 楊玉祥

雀科、連雀科、山雀科和長尾山雀科都屬於小型燕雀目鳥類，其中山雀和長尾山雀科更是小巧玲瓏。雀科除酒紅朱雀、褐鶯及灰鶯三種為特有亞種外，其餘多為稀有的過境鳥或冬候鳥，且離、外島地區較常見，而普通朱雀與連雀科的朱連雀、黃連雀均為迷鳥，因此一出現時，多為鳥友們競相追逐的焦點。

山雀科在台灣有 5 種記錄，僅白頰山雀為迷鳥，其餘 3 種為特有亞種、一種台灣特有種(黃山雀)；長尾山雀科在台灣僅有一種～紅頭山雀，為留鳥。山雀科鳥種及紅頭山雀常與其他的鳥種混群，十分活潑好動，常是賞鳥過程中的開心果。

以下整理了雀科、連雀科、山雀科及長尾山雀科等鳥類的辨識重點提供鳥友們參考：

雀科		
花雀 燕雀	Brambling <i>Fringilla montifringilla</i> ，體長 16 cm。 嘴黃色、末端黑色。雄鳥繁殖羽：頭至後頸黑色、羽緣淡色。非繁殖羽及雌鳥較淡色、斑駁。 喉、胸至肩部橙色，翼黑色、有 2 條白色翼帶，腰白色，尾羽黑色。脇淡紅色有黑色圓點，腹以下白色。	稀有冬候鳥 成對或小群出現於平地至山區之樹林邊緣及草原地帶。
金翅雀	Oriental Greenfinch <i>Carduelis sinica</i> ，體長 14 cm。嘴肉紅色，雄鳥頭部黃綠色，體綠褐色，飛羽、尾羽黑色、羽緣白色、基部黃色明顯。雌鳥頭部淡褐色、全身羽色較暗。	稀有冬候鳥 成群出現於平地至山區之樹林、苗圃地帶。
黃雀	Spruce Siskin <i>Carduelis spinus</i> ，體長 12 cm。嘴肉紅色，雄鳥頭、背面黃綠色，翼黑色、羽緣黃色有 2 條黃色翼帶，腰部、尾羽亮黃色，尾中央、末端黑色。腹面亮黃色、腹以下白色、有縱斑。雌鳥顏色較淡，身上縱斑較多。	稀有冬候鳥 成群出現於平地至中海拔的樹林地帶。
普通朱雀 朱雀	Common Rosefinch <i>Carpodacus erythrinus</i> ，體長 14cm。雌鳥黃褐色，腹淡色有暗色縱斑。雄鳥頭至頸、胸、腰暗紅色	迷鳥
酒紅朱雀 台灣朱雀	Vinaceous Rosefinch <i>Carpodacus vinaceus</i> ，體長 15 cm。 雄鳥通體酒紅色、眉斑粗大、白色，飛羽、尾羽黑色、飛羽羽緣白色。雌鳥身上暗褐色、有暗色細縱斑。	特有亞種 通常成對出現於中至高海拔之林緣、草原。
灰鶯 灰頭灰雀	Beavan's Bullfinch <i>Pyrrhula erythaca</i> ， 體長 15 cm。 雄鳥體黃褐色，頭灰色， <u>嘴基至眼有明顯的黑色三角形</u> ，飛羽、尾羽黑色。雌鳥體灰色，其餘與雄鳥同。	特有亞種 通常小群出現於中、高海拔山區樹林。



褐鶯 褐灰雀	Brown Bullfinch <i>Pyrrhula nipalensis</i> ，體長 16 cm。全身灰褐色，眼先、飛羽及尾羽黑色，眼下有一白色細弧線。	特有亞種。通常小群出現於中、高海拔山區樹林。
臘嘴雀 錫嘴雀	Hawfinch <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ，體長 18 cm。嘴粗大、灰褐色，頭橙褐色，眼先黑色、向下延伸至喉部，有灰色頸環。體褐色、腹面較淡，翼上有大塊白斑，尾羽黑色、末端白色。	稀有過境鳥 成對或小群出現於平地至中海拔樹林中、上層。
小桑鶯 小黃嘴雀	Black-tailed Hawfinch <i>Eophona migratoria</i> ，體長 18 cm。嘴亮黃色、末端黑，雄鳥頭至頸部黑色，體褐色、腹面較淡，飛羽、尾羽黑色，翼上有白斑。雌鳥頭部淡褐色，其餘似雄鳥、較淡色。	稀有冬候鳥 小群出現於樹林地帶
桑鶯 黃嘴雀	Masked Hawfinch <i>Eophona personata</i> ，體長 23cm。嘴亮黃，頭上半黑色，體灰色，飛羽、尾羽黑色，翼上有白斑。	稀有冬候鳥 小群出現於樹林地帶
<b>連雀科</b>		
朱連雀 緋連雀 小太平鳥	Japanese Waxwing <i>Bombycilla japonica</i> ，體長 18cm。頭上有冠羽，全身淡紫褐色，翼黑色、翼上有紅斑紋、飛羽末端白色，尾羽末端紅色。腹中央黃色，尾下覆羽紅色。	迷鳥
黃連雀 太平鳥	Bohemian Waxwing <i>Bombycilla garrulus</i> ，體長 19 cm。頭上有冠羽，喉黑色，全身為灰褐色，尾羽末端黃色。	迷鳥
<b>山雀科</b>		
白頰山雀 大山雀	Gret Tit <i>Parus major</i> ，體長 14 cm。頭頂、喉、頸黑色，向下延伸至腹部中央呈縱帶。頰白色大塊明顯，後頸黃綠色，背淡藍色，翼有白色橫帶。腹側白色或黃白色。	迷鳥
青背山雀 綠背山雀 ★三級保育類	Green-backed Tit <i>Parus monticolus</i> ，體長 12 cm。頭頂、喉、頸黑色，向下延伸至腹部中央呈縱帶。頰白色大塊明顯，後頸有白斑，背部黃綠色，翼黑褐色有 2 條白色細翼橫帶，飛羽外瓣、尾羽淡藍色。腹側黃色。	特有亞種 常成對或成群出現於山區樹林中。常與其他山雀或畫眉科鳥類混群。
黃山雀 ★二級保育類	Formosan Yellow Tit <i>Parus holsti</i> ，體長 14 cm。頭有長冠羽，背面黑色，臉、腹面黃色。翼淺藍色，飛羽末端白色。	台灣特有種。常單獨、成對或小群混於山雀科或畫眉科的群體中。
煤山雀 ★三級保育類	Coal Tit <i>Parus ater</i> ，體長 11 cm。頭有長冠羽、黑色，頰白色，通體灰色的山雀。	特有亞種。常與其他山雀科或畫眉科鳥類混群。
赤腹山雀 雜色山雀 ★二級保育類	Varied Tit <i>Parus varius</i> ，體長 11 cm。頭上半部、後頸及喉部黑色。額至頰白色明顯，背灰色，腹部栗紅色的山雀。	特有亞種。僅分布於中、北部山區樹林中，通常單獨或成對出現。
<b>長尾山雀科</b>		
紅頭山雀 紅頭長尾山雀	Red-headed Tit <i>Aegithalos concinnus</i> ，體長 10 cm，尾長。頭頂紅褐色，過眼線粗黑，背面藍灰色、腹面大致白色，喉中央有黑色大型斑塊，胸有栗紅色橫帶，中央不相連。	留鳥 通常大群出現

赤腹山雀  
沈炳雄 攝

