

鳩鴿科鳥類辨識

小撇步



全世界有 308 種鳩鴿科鳥類，分布於台灣的有 12 種，其中有 8 種為繁殖留鳥，少數為迷鳥，有些在離、外島地區為當地過境鳥，如東沙島有穩定的金背鳩過境，紅鳩及珠頸斑鳩為稀有過境鳥；另外，家鴿為野鴿馴化種，且跟隨著人類腳步一起散佈到全球各處，其後又逸出於各地。

鳩鴿科體型中等，頭部小、嘴短、腿短、身體粗壯且飛行肌肉發達，善於步行及飛行。牠們通常成對或成群出現，棲息地從海岸防風林到山區中海拔山區都有，其中，紅鳩、珠頸斑鳩都是最普遍常見的鳥種，而紅頭綠鳩、長尾鳩為局部分布種類。鳩鴿科都以果實、種子等為主食，偶而會吃蟲，常在地面走動覓食，肥短的體態再加上隨著腳步不停擺動的頭部，動作有點滑

稽；也會在樹上取食果實。鳩鴿科繁殖行一夫一妻制，雌雄鳥會共同孵卵及餵食，通常在樹上以枝條鋪成淺碟狀巢，有時會有如公寓般的集體共同繁殖；育雛期間親鳥會分泌鴿乳，餵食時把喙張開，由幼鳥將頭部伸入消化道中進食。

以下是一些鳩鴿科鳥類的野外辨識小「撇步」供各位鳥友參考，扣除掉十分稀有、少見的迷鳥—烏鳩（黑林鴿）及橙胸綠鳩，並加入在高雄地區「局部普遍」的逸出種斑馬鳩：



翠翼鳩·陳世明 攝

鴿屬	
家鴿 粉鳥（台）	<ul style="list-style-type: none"> • Rock Dove <i>Columba livia</i>，體長 33 公分，馴化種逸出，體壯、尾短。 • 頭暗色、頸有亮紫色金屬光澤。體灰，飛羽末端黑色，收疊時呈 2 道帶狀。 • 飛行時振翼快速，求偶季節常滑翔，翼略上舉呈淺 V 字型。 • 常成群結隊於公園綠地，在建築物上集結築巢，也會利用冷氣孔築巢。
灰林鴿	<ul style="list-style-type: none"> • Ashy Woodpigeon <i>Columba pulchricollis</i>，體長 34 公分，體壯、尾短。 • 頭部淺灰色，體暗色。飛行時與家鴿相似，但頭部淡色形成明顯對比。 • 常單獨或小群出現於中海拔山區，偶有數十隻的大群，冬季會降遷。
斑鳩屬	
紅鳩 火離（台）	<ul style="list-style-type: none"> • Red Turtle Dove <i>Streptopelia tranquebarica</i>，體長 23 公分，體短胖、尾短。 • 頭至頸灰色，後頸有黑頸環。雄鳥身體為葡萄酒紅色，雌鳥褐色，腳黑色。 • 成群出現平地公園綠地、農耕地，有時達數百隻以上，亦出現於山區農耕地。

金背鳩 山斑鳩 ★特有亞種	<ul style="list-style-type: none"> • Oriental Turtle Dove <i>Streptopelia orientalis</i>，體長 33 公分，體壯、尾短。 • 體淡褐色，頸部兩邊有黑白相間之條紋。覆羽有紅褐色羽緣，形成魚鱗狀斑。 • 常成對或小群出現於平地到中海拔樹林地帶，也會停棲於山區的電線上，偶見於收割後的農耕地帶覓食。
珠頸斑鳩 斑鳩、珠頸鳩 斑頸鳩 ★特有亞種	<ul style="list-style-type: none"> • Spotted-necked Dove <i>Streptopelia chinensis</i>，體長 30 公分，體壯、尾長。 • 黑底白點的後頸環。全身褐色，頭上半部淡紫灰色。 • 成對或小群出現於平地到中海拔山區的樹林地帶，常停棲於建築物或電線上，常見於公園綠地或農耕地。
鵲鳩屬，本屬在台灣僅有一種紀錄	
長尾鳩 赤鵲鳩 IVOAO (達悟語)	<ul style="list-style-type: none"> • Philippine Cuckoo Dove <i>Macropygia tenuirostris</i>，體長 40 公分，體壯、尾短。 • 頭至胸褐色，背暗色有光澤。 • 蘭嶼普遍種，台灣本島僅零星出現於恆春半島及東台灣的樹林地帶
翠翼鳩屬，本屬在台灣僅有一種紀錄	
翠翼鳩 翠翼金鳩 林鴛鳥 (台)	<ul style="list-style-type: none"> • Emerald Dove <i>Chalcophaps indica</i>，體長 23 公分，體短胖、尾短。 • 嘴紅，頭頂灰褐色，眉線白色。體紅褐色，背及翼覆羽翠綠色有光澤。公鳥較鮮艷 • 單獨或成對出現於平地至低海拔山區的樹林底層。 • 高雄柴山十分常見，不太懼怕人類，容易觀察。
綠鳩屬	
綠鳩 紅翅綠鳩 青雛 (台) ★特有亞種	<ul style="list-style-type: none"> • White-bellied Green Pigeon <i>Treron sieboldii</i>，體長 31 公分，體壯、尾短。 • 嘴深藍色，體大致綠色，尾羽外側黑色。 • 雄鳥覆羽紫紅色，腹部黃白色，雌鳥顏色較黯淡。 • 單獨或成群出現於低到中海拔樹林之上層。 • 常發出有連續、許多音節、高低變化的「嗚-」長音。
紅頭綠鳩 紅頂綠鳩 ★II級保育類	<ul style="list-style-type: none"> • Whistling Green Pigeon <i>Treron formosae</i>，體長 33 公分，體壯，尾短，大致似綠鳩 • 尾羽全綠色。雄鳥頭頂明顯紅色，雌鳥通體綠色，胸、腹部不帶黃白色。 • 單獨或成群出現於平地到低海拔樹林之上層。 • 僅南部、東部及離島蘭嶼等處局部分布，本島的記錄十分零星。
果鳩屬，本屬在台灣僅有一種紀錄	
小綠鳩 黑頰果鳩	<ul style="list-style-type: none"> • Black-chinned Fruit Dove <i>Ptilinopus leclancheri</i>，體長 28 公分，迷鳥。 • 體小，嘴黃色，背面翠綠色有光澤。雄鳥臉至胸淡色，頰黑色。 • 下胸有一紫褐色橫帶，腹部淺黃色，尾下覆羽紅褐色。
姬地鳩屬	
斑馬鳩	<ul style="list-style-type: none"> • Zebra Dove <i>Geopelia striata</i>，體長 20-23 公分。 • 體小、尾略長，通體灰褐色。背面、頸、胸頭密布暗色細橫紋。 • 逸出種，原產地為東南亞，目前族群集中於高雄鳳山衛武營都會公園一帶。