

鶇科·山椒鳥科鳥類辨識

小 撇 步

整理／楊玉祥

紅嘴黑鶇·蘇貴福 攝



前言

在台灣，鶇科為最普遍、最常見的科別之一，舉凡都市三寶的白頭翁，或是進入平地到山區的樹林中常見到的紅嘴黑鶇，都是非常熟悉的鳥種。鶇科雖然樹棲，卻喜歡停棲於樹木的上層且有群聚性，

常常成小群出現，有時會有數十隻以上的大群，再加上其習性嘈雜，不論是烏、白頭翁那「巧克力·巧克力」似的叫聲、白環鸚嘴鶇的「記·得·是·誰」抑或是紅嘴黑鶇的「小氣鬼·小氣鬼」跟「喵～」聲，只要牠們一出現，總是很快地就引起大家的注意，屬於容易觀察的一群。

另在台灣低、中海拔山區，有一種鳥種其公、母鳥體色一紅一黃，繁殖季節通常成對出現，兩者都十分鮮艷、引人注目，根據這樣的敘述，老練的鳥友馬上可以猜出是戲班鳥—灰喉山椒鳥(台灣野鳥圖鑑上使用的舊名為紅山椒鳥，學名 *Pericrocotus divaricatus*)，鳥友們總愛開玩笑說「紅」山椒鳥之所以改名為「灰喉」山椒鳥，是因為母鳥並不紅，所以要男女平等(會不會想太多了啊? = =)！牠們屬於山椒鳥科，是台灣山林裡最令人印象深刻的色彩之一，但牠們的近親卻一個一個生得樸素、黯淡，十分有趣。

居留狀態及特有性

鶇科(Pycnonotidae)及山椒鳥科(Campephagidae)

在分類上，都屬於動物界(Animalia)—脊索動物門(Chordata)—鳥綱(Aves)—雀形目(Passeriformes)。

鶇科全球共計約 22 屬 118 種(劉小如等 2010, 台灣鳥類誌)，根據 2011 年中華鳥會頒布的最新名錄，在台、澎、金馬地區記錄過的有 4 個屬，包括：鶇屬(2 種)、鸚嘴鶇屬(1 種)、棕耳鶇屬(1)及短腳鶇屬(1 種)；在台灣 5 種鶇科鳥種中，僅棕耳鶇為過境鳥(棕耳鶇在蘭嶼與綠島為普遍留鳥)，其餘 4 種均為留鳥。在特性方面，烏頭翁為台灣特有種，而白頭翁、白環鸚嘴鶇、紅嘴黑鶇及蘭嶼、綠島的棕耳鶇都是台灣特有亞種。此外，在高雄的南壽山地區，晚近有一種鶇科的外來鳥種—紅耳鶇穩定地出現。

而山椒鳥科全球共計約 7 屬 81 種，在台、澎、金馬地區的記錄為 3 個屬，包括鶇屬(2 種)、鳴鶇屬(1 種)及山椒鳥屬(5 種)；而山椒鳥科的 8 種中，有 4 種迷鳥(黑原鶇、小灰山椒鳥、長尾山椒鳥及琉球山椒鳥)及 2 種遷移鳥種(冬候鳥及過境鳥，黑翅山椒鳥、灰山椒鳥)，其餘 3 種為留鳥，全無台灣特有種或特有亞種。



黑原鶇·鄭政卿 攝

外型

鶇科為中小型雀形目鳥類，嘴細、中等長，略下彎，適合啄食果實(鸚嘴鶇屬嘴短，明顯下彎，似鸚鵡的嘴型，可咬破較厚的果皮)，

以果實及昆蟲為主食，大多數種類背上以灰、綠色或棕色為主，跗蹠短，尾部長；棕耳鶇屬則通體褐色。

山椒鳥科為小型到中小型雀形目鳥類，嘴短、上喙尖端向下彎曲，適合啄食昆蟲及果實。腳細弱、跗蹠具有盾狀鱗(台灣鳥類誌)。除灰喉山椒鳥外，其餘各種的體色以黑、白、灰為主，尾部長。

生態習性

在台灣，鶇科鳥類從沿海平原的開闊地到中、高海拔的森林裡，都可以見到牠們的蹤影，有些種類非常適應人類的聚落或都市。鶇科為樹棲的鳥類，覓食或水浴時會下地，繁殖期成對活動，非繁殖期成群活動；紅嘴黑鶇的族群有時可達上百隻，並有冬季向高海拔遷移的獨特習性。鶇科的巢成淺盤形、碗形或杯狀、半垂掛形狀，直徑約 20 公分。位置由距地面不遠的小樹或灌叢，直到喬木中層的枝桠間。巢材包括細枝與草葉等(台灣鳥類誌)。

山椒鳥科鳥類習性為樹棲，除了遷移的種類外，通常出現於山區樹林之樹冠層，繁殖期成對活動，非繁殖期間有很強的群聚性。山椒鳥營巢於樹上，巢呈杯狀，以枯草等植物莖葉構成(台灣鳥類誌)。 山椒鳥科的鳥巢呈杯狀·柯木村 攝→

台灣鶇科鳥類野外辨識方法整理

中文名及學名	體型、輪廓、體色、細部觀察特徵	居留狀態
※背灰褐色、喉白色、胸、腹淺灰色		
白頭翁 <i>Pycnonotus sinensis formosae</i> 台灣族群為特有亞種	·體長約 18cm。叫聲圓潤，似「巧克力·巧克力」 ·上頭至後頭白色方形大塊，額、眼周圍至後頸黑色，耳羽污白色，翼及尾羽橄欖綠色。除頭部特徵外，其餘似烏頭翁。	·分布於平地至低海拔樹林地帶，僅分布於台灣西部，南至屏東楓港一帶，東北至宜蘭。
烏頭翁 <i>Pycnonotus taivanus</i> 台灣特有種	·體長約 18cm，叫聲類似白頭翁。 ·額至後頭黑色，嘴基部有一橘色斑，眼周圍至耳羽、後頸白色，顎線黑色，除頭部特徵之外，其餘似白頭翁。	·分布於平地至低海拔樹林地帶，僅分布於東部北至宜蘭以下及恆春半島。


保育類

根據 2008 年農委會修訂之保育類野生動物名錄，目前台灣的鶇科及山椒鳥科的鳥種中，唯有烏頭翁屬於 III 級(其他應予保育之)保育類野生動物。

鶇科、山椒鳥科鳥種辨識

鶇科鳥類由於羽色對比鮮明，習性並不是非常隱密，且普遍常見，辨識上並沒有太大的困難，有些還有獨特、容易判別的鳴叫聲，因此不論從外觀或叫聲上都可以快速地辨識。

山椒鳥科除灰喉山椒鳥有著鮮艷的羽色外，其餘各種之羽色均以黑、白及灰色為主，並均有近似種，不易快速辨識。再加上其體型變化大，如鶇屬屬的花翅山椒鳥及黑翅山椒鳥，都是相對大型的種類，通常會令初次見面的賞鳥人不敢相信山椒鳥竟有這麼「歐記」的成員。因此，我們可以從體型、體色的主要組成等來分辨山椒鳥。以下將台灣的鶇科及山椒鳥科鳥類野外辨識的方法整理成表格，提供鳥友參考。



中文名及學名	體型、輪廓、體色、細部觀察特徵	居留狀態
紅耳鸛 <i>Pycnonotus jocosus</i>	·體長約 20cm。 ·頭上半黑色有長冠羽，耳羽紅色，頰有白色大橢圓斑塊，斑塊周圍鑲黑邊，背面、翼、尾羽為一致的淺灰褐色，尾羽末端白色，尾下覆羽紅色。	·籠中逸鳥
白環鸚嘴鸛 <i>Spizixos semitorques cinereicapillus</i> 台灣族群為特有亞種	·體長 19cm。叫聲短促而連續，似「記·得·是·誰」。 ·頭黑色，體暗綠色，嘴粗短似鸚鵡，黃白色，頰有數道白色細紋與前頸白色頸圈相連。	·分布於低海拔的樹林地帶，通常單獨或小群出現。
紅嘴黑鸛(短腳鸛) <i>Hypsipetes leucocephalus nigerrimus</i>	·體長 24cm。 ·體黑色，嘴喙、腳紅色；中國之族群頭至頸為白色，2009 年曾出現於高雄美術館的雀榕樹上。 ·發出尖銳的「小氣鬼·小氣鬼」或「喵」叫聲。	·分布於平地至中海拔的樹林中，冬季往高海拔遷移。 ·台灣族群為特有亞種
棕耳鸛 <i>Ixos amaurotis harterti</i>	·體長 26cm。 ·體褐色，頭灰色、耳羽栗褐色，腹面褐色較淡，有暗縱斑，尾下覆羽褐色、翼緣淡色。	·在蘭嶼與綠島有特有亞種分布。過境族群出現於海岸到低海拔樹林。

台灣山椒鳥科鳥類野外辨識方法整理

中文名及學名	體型、輪廓、體色、細部觀察特徵	居留狀態
※體灰色、大型		
花翅山椒鳥 <i>Coracina macei</i>	·體長 29cm。體灰色較淡，翼羽黑色，尾方形、黑色、尾羽末端白色，雄鳥額至耳羽、喉黑色	·分布於低、中海拔闊葉林。
黑翅山椒鳥 <i>Coracina melaschistos</i>	·體長 23cm。 ·體灰色較深，翼黑色，尾楔型、黑色，尾羽末端白色。雄鳥腹面有明顯橫紋	·過境期出現於海岸、平地至低海拔樹林，通常單獨出現。
※背灰色、腹面白		
灰山椒鳥 <i>Pericrocotus divaricatus</i>	·體長 19cm。 ·翼、尾羽黑色，尾羽外側白色，雄鳥頭上至後頭、耳羽黑色，雌鳥則與背部一致為灰色。	·過境期出現於海岸、平地至低海拔樹林，常結群出現。
小灰山椒鳥 <i>Pericrocotus cantonensis</i>	·體長 18cm。 ·背面灰褐色，翼、尾羽黑色，尾羽外側白色，胸、脇黃褐色。雄鳥頭上至後頭黑色，雌鳥為一致的灰褐色。	·迷鳥。2011 年 5 月洪貫捷鳥友在東沙島進行監測時曾拍攝記錄到，此為東沙島的新記錄種。
黑原鶇鶇 <i>Lalage nigra</i>	·體長 19cm。頭上、過眼線及背面灰黑色、翼及尾羽黑色，覆羽及飛羽有白色斑，過眼線白色明顯，腹面淡色，胸有細斑紋。	·迷鳥。2007 年 11 月 4 日鄭政卿鳥友在南星計畫區曾有發現記錄。
※體小型、體色紅黑或黃黑對比		
灰喉山椒鳥 <i>Pericrocotus solaris</i>	·體長 18cm。頭上至背暗灰色，頰至喉淺灰。 ·雄鳥腰至尾羽外側、腹面及翼上斑塊為橘紅，雌鳥腰黃綠色，尾羽外側、腹面及翼上斑塊黃色。	·分布於低、中海拔闊葉林地帶。