

# 佛法僧目·鴛形目鳥類辨識

## 小撇步

整理／楊玉祥



### 佛法僧目概述

根據高瑋(1995)的鳥類分類學，佛法僧目(Coraciiformes)：嘴型長而強直或細而曲。翅大都長而闊，初級飛羽 10 枚或 12 枚，次級飛羽第 5 枚存在或付缺；尾型短或適中，具 10-12 枚尾羽。腳短小，呈三趾前一趾後。分布較廣，熱帶及亞熱帶為多。


根據中華民國野鳥學會鳥類記錄委員會(2011)所頒訂之台灣鳥類名錄，佛法僧目有 4 科 11 種，分別為翠鳥科(7 種)、蜂虎科(2 種)、佛法僧科(1 種)及戴勝科(1 種)。翠鳥科中僅有翠鳥(*Alcedo atthis*)為台灣地區留鳥(少數為過境鳥)與斑翡翠為金門地區留鳥(馬祖地區為稀有過境鳥)，其餘均為迷鳥或遷移性鳥種；蜂虎科之 2 種鳥類在台灣為迷鳥，僅栗喉蜂虎為金門地區普遍的夏候鳥；佛法僧於台灣及金門、馬祖地區之居留狀態均為過境鳥；戴勝除在金門有留鳥族群及過境鳥外，在台灣及馬祖地區為冬候鳥或過境鳥。

佛法僧目的鳥類中，各科別鳥種間嘴型變化相當大，翠鳥科的各種鳥類嘴粗長而直，蜂虎嘴細長、尖銳而彎曲，佛法僧嘴大而寬，而戴勝嘴甚長而彎。

### 鴛形目概述

鴛形目(Piciformes)的鳥類，嘴喙一般強直呈錐狀，適於鑿木。翅適中或短圓，第 5 枚次級飛羽存在；尾為平尾或楔尾，羽軸突出成針狀，尾羽 10-12 枚。腳短而強，呈對趾形，趾端具銳爪(高瑋 1995)。在台灣、馬祖及金門地區共分布 2 科 5 種：鬚鴛科(1 種)及啄木鳥科(4 種)，其中僅有地啄木為遷移鳥種，在台灣為稀有過境鳥，並於金門(冬候鳥)及馬祖(過境鳥)等地有過境或越冬記錄，其餘各種均為台灣島之留鳥(中華鳥會鳥類記錄委員會 2011)，五色鳥為台灣特有種、大赤啄木為台灣特有亞種。

鬚鴛科的五色鳥及啄木鳥科之各種啄木鳥自行啄出樹洞為巢，兩者均屬於樹棲型鳥類；唯不同的是五色鳥嘴型較粗短，且只有營巢時會啄樹，平時以果實或抓取昆蟲為食；啄木鳥則以樹皮下的蠕蟲為食，覓食時會啄木，其覓食行為通常會先聽音辨位，之後才會啄穿樹皮，再以長舌把底下的蟲子勾出。



小啄木/王健得 攝



戴勝·陳世明 攝



佛法僧·李俊輝 攝

Photo by J.H.Lee



栗喉蜂虎·辛啟昭 攝

鳥種名	學名	台灣	馬祖	金門	特有性/保育等級
※翠鳥科Alcedinidae					
翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普/過、不普	留、普	留、普	 蒼翡翠 柯樹恩 攝
三趾翠鳥	<i>Ceyx erithaca</i>	迷	無	無	
赤翡翠	<i>Halcyon coromanda</i>	過、稀	過、稀	過、稀	
蒼翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	過、稀	留、不普	留、不普	
黑頭翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	冬、稀/過、稀	過、稀	冬、不普	
白領翡翠	<i>Todiramphus chloris</i>	迷	無	無	
斑翡翠	<i>Ceryle rudis</i>	無	過、稀	留、不普	
※蜂虎科Meropidae					
栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	迷	無	夏、普	
彩虹蜂虎	<i>Merops ornatus</i>	迷	無	無	
※佛法僧科Coraciidae					
佛法僧	<i>Eurystomus orientalis</i>	過、稀	過、普	過、稀	
※戴勝科Upupidae					
戴勝	<i>Upupa epops</i>	冬、稀/過、稀	過、普	留、普/過、不普	
※鬚鬣科Megalaimidae					
五色鳥	<i>Megalaima nuchalis</i>	留、普	無	無	特有種
※啄木鳥科Picidae					
地啄木	<i>Jynx torquilla</i>	冬、稀/過、稀	過、稀	冬、不普	
小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	留、普	無	無	
大赤啄木	<i>Dendrocopos leucotos</i>	留、不普	無	無	特有亞種，二級保育類
綠啄木	<i>Picus canus</i>	留、稀	無	無	二級保育類

### 鳥類辨識小撇步

佛法僧目及鬣形目的鳥類都有其獨特的特徵，建議先以嘴型判斷其科別，再從身上的顏色及斑塊去分辨種類。

茲將簡易、快速的分辨方式整理如下表，供鳥友們參考。



中文名及學名	辨識特徵・1	辨識特徵・2
翠鳥科 Alcedinidae：嘴粗厚而直，身體粗壯，翅膀及尾羽短。腳甚短、通常紅色，適合抓握、站立於枯枝上，以捕食魚類或昆蟲為食。		
翠鳥 <i>Alcedo atthis</i>	小型，約 16 cm，嘴黑色，頭至後頸綠色，喉、耳羽白色。	背至尾羽藍色，有金屬光澤，腹面橙紅色。雌鳥下喙基部紅色。
三趾翠鳥 <i>Ceyx erithaca</i>	極小型，約 14 cm，嘴橙色，偶有斑駁黑色。	背紫紅、翅藍紫色，有光澤，腹面橙紅色。
赤翡翠 <i>Halcyon coromanda</i>	大型，約 27 cm，嘴紅色。	全身栗紅色，有紫紅色光澤，腰有藍色斑塊，腹面栗紅色較淺。

中文名及學名	辨識特徵 · 1	辨識特徵 · 2
蒼翡翠 <i>Halcyon smyrnensis</i>	大型，約 27 cm，嘴紅色，頭至後頸、小覆羽、胸部以下均為栗褐色，喉至上胸白色。	背至尾羽、飛羽藍色有光澤，初級飛羽基部白色、末端黑色。
黑頭翡翠 <i>Halcyon pileata</i>	大型，約 27 cm，嘴紅色，頭上半部黑色，下半部及喉、頸白色形成明顯的頸圈。	背部至尾羽為暗藍色有光澤，覆羽黑色，初級飛羽基部白色、末端黑色，腹以下橙色。飛行時，可見飛羽有大塊白色。
白領翡翠 <i>Todiramphus chloris</i>	中型，約 18 cm，嘴黑色，下嘴淡色。	背面藍色有光澤，頸圈及腹面白色。
斑翡翠 <i>Ceryle rudis</i>	大型，約 31 cm，嘴黑色，頭頂黑色、略有冠羽，眉白色明顯。	背面黑白相間，腹面白色，雄鳥胸有 2 道黑色橫帶，雌鳥僅有 1 道。
<b>蜂虎科 Meropidae</b> ：嘴細長而彎，善於在飛行中捕食飛蟲，體修長，中央尾羽長而突出。		
栗喉蜂虎 <i>Merops philippinus</i>	體長約 30 cm，過眼線黑色明顯，下鑲白線，喉栗褐色。	體色以綠色為主，飛羽及腰至尾羽藍色有光澤。
彩虹蜂虎 <i>Merops ornatus</i>	體長約 25 cm，過眼線黑色明顯，下鑲藍線，喉栗褐色，下鑲黑線體。	頭頂褐色，後頸及覆羽綠色，飛羽栗紅色，腰至尾羽藍色有光澤。
<b>佛法僧科 Coraciidae</b>		
佛法僧 <i>Eurystomus orientalis</i>	體長約 28 cm，嘴紅色、寬短，末端下鉤，腳紅色。	頭黑色。背面大致綠色，腹面藍綠色，飛羽及尾羽黑色。飛行時可見初級飛羽基部有白色斑塊。
<b>戴勝科 Upupidae</b>		
戴勝 <i>Upupa epops</i>	體長約 28 cm，嘴黑色、細長、下彎。頭有黃色長冠、末端黑色。	臉至背、覆羽、胸部黃褐色，飛羽及尾羽黑白相間，腹以下白色。
<b>鬚鴛科 Megalaimidae</b>		
五色鳥 <i>Megalaima nuchalis</i>	體長約 20 cm，嘴黑色、寬短、粗厚。	頭大致藍色，有黃、紅色斑點及黑色眉線，體綠色，共為 5 種顏色。
<b>啄木鳥科 Picidae</b> ：通常嘴直而硬，尾羽甚硬，站立在樹枝或樹幹上時，常以尾羽輔助支撐。		
地啄木 <i>Jynx torquilla</i>	小型，約 16 cm，有扭動脖子的行為。	全身灰褐色，背面較深，密佈蟲蠹斑。
小啄木 <i>Dendrocopos canicapillus</i>	中型，約 22 cm。飛行時可見背中央有白色斑塊。	頭頂至背面黑色，有斑色斑點，腹淡色、有細縱斑。
大赤啄木 <i>Dendrocopos leucotos</i>	大型，約 25 cm，♂頭頂紅色，♀黑色。	背面黑色，臉白色，有黑色顎線，腹面淡色有縱斑，尾下覆羽紅色。
綠啄木 <i>Picus canus</i>	大型，約 26 cm，♂頭頂紅色。	頭灰色，後頭有黑色中央線，全身大致綠色，初級飛羽及外側尾羽黑色，且有白斑。