

啄花鳥科、麻雀科、文鳥科鳥類辨識

小撇步

整理／楊玉祥

啄花鳥科 Dicaeidae：

啄花鳥科(Dicaeidae)體型纖小。嘴小，呈三角形，嘴緣先端具均勻細小的鋸齒。鼻孔外露，被有不完全的膜，嘴鬚短。兩翅較小，初級飛羽 9 枚或 10 枚，前者第一枚初級飛羽最長，而後者極短小。尾短，尾羽 12 枚。雌雄異色，有些種類則相似，幼鳥與雌鳥同色(高瑋 鳥類分類學 P.280)。在生態方面，啄花鳥除繁殖季單獨或成對出現外，有很強的群聚性。棲息於森林中上層，以昆蟲、蜘蛛等及漿果為主食，並喜歡啄食花蜜，扮演重要的傳播花粉及種子的角色。

目前台灣有 2 種啄花鳥科鳥種分布，且都屬於啄花鳥屬(Dicaeum)，為紅胸啄花(*D. ignipectus*)及綠啄花(*D. minullum*)2 種，體型均只有 8-9 公分，十分嬌小，再加上生性活潑好動，在樹林中、上層活動時更是不易觀察。然而這 2 種啄花鳥都很喜歡取食桑寄生之果實，因此，鳥友們可把握桑寄生開花結果之季節，仔細觀察、耐心等待，便有機會觀察到啄花鳥小巧玲瓏的身影，幸運的話，還可以看到牠們把具有黏性的排遺沾在樹上，幫忙傳播種子的行為。

麻雀科 Passeridae、梅花雀科 Estrildidae、文鳥科 Ploceidae 及維達鳥科 Viduidae：

在台灣野鳥圖鑑中，麻雀科(Passeridae)與梅花雀科(Estrildidae)被歸屬於文鳥科(Ploceidae)之後，後又因分類系統之調整而將麻雀科及梅花雀科獨立，原本文鳥科在台灣已沒有任何鳥種，直到近年因引進種寡婦鳥逸出而被鳥友發現，另外還有維達鳥科(Viduidae)的針尾維達鳥等，也因為人為引進和逸出，相繼在野外出現。

麻雀科(Passeridae)目前在台灣共記錄有 3 種：麻雀(*P. montanus*)、山麻雀(*P. rutilans*)及家麻雀(*P. domesticus*)，其中家麻雀為今年(2012)才被新增到台灣鳥類名錄之中的迷鳥。

麻雀的英文名是 Tree Sparrow 但在台灣卻很少住在樹上而是住在家裡，家麻雀在其原本分布地區的情形也是如此一樣，而台灣的山麻雀亦會利用山上的電線桿的孔洞築巢，因此我們可以

說麻雀科的鳥種，都十分喜愛與人為鄰。

梅花雀科(Estrildidae)多是極小的鳥，體羽鮮明，有白斑。尾尖而長。嘴圓錐形而有鮮明色彩，有的種類在口蓋上有明顯斑，有的斑融合成為掌形。有的種類雌雄顏色不同，雄性色彩鮮明並有長尾羽；雌性暗淡。(高瑋 鳥類分類學 P.295)

麻雀科、梅花雀科、文鳥科及維達鳥科的鳥種均為雜食性，但共同特徵為粗短的嘴喙適合咬破禾本等植物的種子，因此，在台灣與人為鄰的麻雀一直被視為農地的害鳥而遭到捕殺；然而這些為數眾多的麻雀在繁殖季節(正好也是農地裡蟲害最多的期間)，卻是很有效地控制了農地裡的蟲害，因此我們實不應該一味地殘害牠們，更應該去想一想人和大自然之間的平衡關係。



台灣 2 種啄花鳥科鳥種辨識方式		
中文名、學名	體長與外型辨識	備註
紅胸啄花 <i>Dicaeum ignipectus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 9 公分，雌雄不同色。 ♂背面暗綠色有藍色光澤，胸紅色、腹橙黃色，胸腹中央有藍色縱線。 ♀背面橄欖綠色，腰、尾上覆羽黃綠色，腹面黃白色、尾下覆羽白色。 	特有亞種 分布海拔 較高
綠啄花 <i>Dicaeum minullum</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 8cm，雌雄相似。 背橄欖綠，腹面黃白色，嘴較紅胸啄花細長、下彎明顯。 	特有亞種 海拔較低
台灣 3 種麻雀科鳥種辨識方式		
麻雀 <i>Passer montanus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 14cm，雌雄同色，嘴黑色、腳肉褐色。 頭至背為暗紅褐色，背有暗色縱斑，頰至喉、頸圈白色，頰有明顯黑斑塊、喉中央有黑線，翼褐色有斑紋，腹面黃褐色。 	
山麻雀 <i>Passer rutilans</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 14cm，外觀似麻雀，雌雄不同色。 ♂頭至背紅褐色，頰無黑斑，腹面白色，冬羽有淡色白眉。 ♀背為褐色，有黃褐色眉線，腹面淺黃褐色，喉中央無黑線。 	I 級保育 類
家麻雀 <i>Passer domesticus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 15cm，外觀似麻雀，雌雄不同色。 ♂頭部、頰灰色。眼先、喉部、上胸黑色。夏羽，喙藍黑色、腳褐色，冬羽顏色較淡，喙黃褐色。 ♀頭部及喉部無黑色塊，頭部亦不灰，上半部有藍色的條紋。 	
台灣 7 種梅花雀科鳥種辨識方式		
斑文鳥 <i>Lonchura punctulata</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 11 cm，嘴鉛灰色、腳黑色。 背面大致褐色，胸、腹淡色有明顯鱗斑。 	
白腰文鳥 <i>Lonchura striata</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 11 cm，上嘴黑色、下嘴鉛色。背面、上胸大致暗褐色，淡色羽軸明顯，腰白色，尾尖型、黑色，下胸及腹部污白色。 	
黑頭文鳥 <i>Lonchura atricapilla</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 10 cm，嘴鉛灰色。 頭、腹部中央至尾下覆羽黑色，全身栗褐色。 	
白頭文鳥 <i>Lonchura maja</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 11 cm，嘴銀灰色。 頭至頸白色，體栗褐色。 	引進種
白喉文鳥 <i>Euodice malabarica</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 11 cm，嘴銀灰色。背面褐色，頰及喉部淡色，脇至腹部黃白色，腰及尾下覆羽白色，尾部尖型、黑色，外側尾羽栗紅色。 	引進種
橙頰梅花雀 <i>Estrilda melpoda</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 10 cm，嘴紅色，頭灰色。背黃褐色、腰紅色。 尾羽略長、鼠灰色，眼周圍至頰橙紅色、明顯，腹面污白色。 	引進種
橫斑梅花雀 <i>Estrilda astrild</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 10 cm，嘴紅色、腳黑色。頭灰色，眼周圍紅色、明顯。 體褐色、密佈細橫紋、腹面褐色稍淡。 	引進種
文鳥科		
紅寡婦鳥 <i>Euplectes orix</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 11cm，嘴粗短、黑色。♂繁殖羽十分鮮艷，額至眼周圍黑色，後頭至頸、上胸、背部至尾上覆羽、尾下覆羽紅色或橙色，胸至腹黑色。 ♂非繁殖羽及♀背面褐色有許多斑紋，眉線白，腹面淡色有縱紋。 	引進種
維達鳥科		
針尾維達鳥 <i>Vidua macroura</i>	<ul style="list-style-type: none"> 體長 13cm，繁殖♂連尾羽可達 30cm。嘴紅色，腳黑色。 ♂繁殖羽頭上半部黑色，背黑色、覆羽白色形成大白斑，尾羽黑色甚長，腹面白色。非繁殖羽及雌鳥褐色，背有黑斑，頭側線及眼後黑線。 	引進種