

鳥類的花花世界

整理／楊玉祥

常見的(黑)(白)鳥辨識小撇步

賞鳥是一件有趣的事，其中，鳥類辨識更是一門令人又愛又恨的學問，過去這段期間，我們花了許多時間介紹各個科別的鳥類辨識方式，由科別入門是個比較艱澀的方式，所以接下來，且讓我們嘗試用另一種有趣但也頗為實用的分類法：以各種羽色的配色，來進行鳥類探索的第一步，然後再利用一步步細分的辨識方式，來認識身邊周遭常見的鳥類吧！首先，就讓我們從最有趣的配對「黑與白」開始，希望這個有趣的話題順利展開，可以幫助各位鳥友在野外快速地辨識。

都市中，我們就可以常常見到許多體色黑與白的對比，或是乍看之下以為是黑白雙色的鳥

種，例如八哥科的八哥(*Acridotheres cristatellus*)、白尾八哥(*Acridotheres javanicus*)與體型纖細的白鵲鴿(*Motacilla Alba*)，都是在台灣各個都市中常見的黑白鳥代表，在許多水濱，我們也可以看到黑白兩色的鳥種，如高蹺鴿、反嘴鴿…等。由於跨越的類別太多，在鳥種選介上無法包含台灣所有的近似黑白雙色的鳥種，只納入了一些幾近全黑或全白的鳥種以作為對照，有些則暫時予以排除，若有不齊全之處，敬請各位鳥友見諒。




白面白鵲鴿·王健得 攝

一、都市中常見的〈黑白鳥〉



環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
體型比〈珠頸斑鳩〉小，體長約 23-25cm，粗壯、腳強健		
利用人造設施的孔洞營巢及育雛，夜棲時會集結成數百隻的大群聚；單獨、成對或成群於草地走或跳躍，或停棲於樹上或人造設施。	<ul style="list-style-type: none"> • 頭、翼黑色。 • 翼上有白斑、飛行時明顯。 • 尾羽末端白色。 • 叫聲多變，常常有嘹亮的哨聲或粗啞的呱聲。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嘴黃，體灰，尾下覆羽白色：白尾八哥 (<i>Acridotheres javanicus</i>) 2. 眼周圍有黃色裸皮，嘴黃，體褐，尾下白色：家八哥 (<i>Acridotheres tristis</i>) 3. 嘴白，體與頭、翼同為黑色，尾下覆羽黑色有白色橫紋：八哥 (<i>Acridotheres cristatellus</i>)
體型約與〈白頭翁〉相同，體長約 19cm，瘦長、尾細長		
常在水域附近行走，在都市中可見其行走在路面或建築物頂樓。停棲或行走時，會上下抖動長尾羽；飛行時波浪狀明顯，常邊飛邊發出「唧·唧唧·」叫聲。	<ul style="list-style-type: none"> • 臉大部分白色(某些亞種有過眼線)。 • 頭頂、背至尾羽黑色(某些亞種或冬羽背灰色)而外側尾羽白色 • 腹面大致白色，胸有黑色區塊 	亞種區分參考台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等，1995) <ol style="list-style-type: none"> 1. 臉部無過眼線，胸前大塊黑色與背部黑色相連：白面白鵲鴿 (<i>Motacilla alba leucopsis</i>) 2. 臉部有過眼線，背灰，與胸前黑色細頸圈相連：白鵲鴿 (<i>M. a. lugens</i>) 3. 臉部有過眼線，背灰，不與胸前大塊黑色斑塊相連：黑眼線白鵲鴿 (<i>M. a. ocularis</i>)

圖由左至右：台灣八哥·朱海文 攝。家八哥·陳世明 攝。白尾八哥·朱海文 攝



體型比〈鴿子〉更大，尾羽長，體長約 45cm，粗壯		
單獨或成對活動，行走或跳躍在周圍有樹林的開闊地，在都市中會利用高壓電塔等高處以樹枝堆疊成球形或碗形的巢。繁殖季後會形成數十隻的大群。	<ul style="list-style-type: none"> • 頭至後頸、胸全黑，背至尾羽、翼暗藍色(遠看近似黑色)。 • 肩羽及腹部白色。 • 常常發出「七卡·七卡」的粗啞叫聲。 	1. 喜鵲(<i>Pica pica</i>)  王健得 攝

二、山區常見的〈黑白鳥〉

環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
體型比〈珠頸斑鳩〉小，體長約 24cm，瘦長、尾長		
成群出現於平地至低、中海拔樹林地帶，性吵雜，常發出尖銳的「啾...」叫聲或似貓叫的「喵-」聲。	<ul style="list-style-type: none"> • 嘴、腳紅色。 • 體黑色，飛羽及尾羽有灰白色細邊。 	1. 翼上及尾羽的灰白色可用來區分紅嘴黑鵯(<i>Hypsipetes leucocephalus</i>)與大卷尾或小卷尾等近似種  李俊輝 攝
體型比〈麻雀〉大或略小，體長約 12cm，腳長		
常常單獨或成對出現，活動於山區溪澗或水域附近，喜快速行走於岩石上。	<ul style="list-style-type: none"> • 腳粉色，額白色，臉至背、上胸黑色，腰至尾上白色，尾羽黑色、外側白色。 • 翼黑色有白斑，飛行時形成翼帶狀，腹面白色，脇有灰斑紋。 	1. 小剪尾(<i>Enicurus scouleri</i>)  陳世明 攝




圖由左至右：蒼燕鷗·王健得 攝。鷗嘴燕鷗·楊玉祥 攝。白斑軍艦鳥·張健樂 攝

三、濕地、海域常見的〈黑白鳥〉

環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
體修長、翼長甚尖		
常在水域或海面飛行	<ul style="list-style-type: none"> • 嘴、腳黑色。 • 體背淺灰色近白色。 • 頭至腹面大致全白。 	1. 體長約 30cm，尾羽長、分叉深，嘴尖細，眼後方黑線至後頸黑色相連：蒼燕鷗(<i>Sterna sumatrana</i>) 2. 體長約 40cm，嘴粗黑、略短，尾羽短、分叉不明顯，初級飛羽末端黑色，夏羽額至後頭黑色，冬羽僅眼後有黑色粗大斑點：鷗嘴燕鷗(<i>Gelochelidon nilotica</i>)
體甚大，體長約 80cm 以上，翼甚寬大，尾羽長、分叉甚深		
常在海面飄飛	<ul style="list-style-type: none"> • 體背及雙翼黑色。 • ♂腹面亦黑、有紅色喉囊。 • ♀或幼鳥通常腹白色。 • 嘴甚長，通常淡色。 	1. 體長 80-100cm，♂腹面全黑、♀腹面白色：軍艦鳥(<i>Fregata minor</i>) 2. 體長約 80cm，不論♂♀之脇羽均有白色：白斑軍艦鳥(<i>Fregata ariel</i>)
約〈鴿子〉般大小，體長約 33cm，嘴、腳細長		
涉禽，常單獨出現於濕地的水域	<ul style="list-style-type: none"> • 體大致黑色，背有許多白斑，眼圈白色，腳暗紅色。 • 嘴黑色，下嘴基紅色。 	1. 鶴鷗(<i>Tringa erythropus</i>)夏羽  陳世明 攝
約〈鴿子〉大小或更大，體長約 32-42cm，嘴、腳甚長		
涉禽，常成群出現於濕地的灘地或水域之中 	<ul style="list-style-type: none"> • 嘴細，直或上翹。 • 腹面大致白色。 	1. 體長 32cm，嘴直，腳甚長、紅色，背至翼暗綠色近黑，臉全白、頭全白或後頭有灰黑色斑塊：高蹺鴿(<i>Himantopus himantopus</i>) 2. 嘴細長、上翹，腳灰色，身體大致白色，只有額至後頭、背及翼上有黑色帶狀，初級飛羽黑色：反嘴鴿(<i>Recurvirostra avosetta</i>)
約〈鴿子〉大小或更大，體長約 33-40cm		
游禽，常成群於水面上漂浮或行走於水岸邊 	<ul style="list-style-type: none"> • 體大致深灰色或黑色。 	1. 通常漂浮於水面，嘴及額板白色明顯，腳暗色有全蹼：白冠雞(<i>Fulica atra</i>) 2. 善於水岸邊行走亦會漂浮於水面，嘴、額板紅色，嘴尖黃色明顯、腳黃綠色、無蹼：紅冠水雞(<i>Gallinula chloropus</i>)



圖由左至右：東方毛腳燕·楊玉祥 攝。灰沙燕·鄭政卿 攝。叉尾雨燕·楊玉祥 攝。小雨燕·朱海文 攝

比〈鴿子〉更大，體長約 45cm，粗壯		
涉禽，常出現於海岸附近	<ul style="list-style-type: none"> • 背面大致為黑色。 • 翼有白斑，飛行呈翼帶。 • 翼角白色往上突出。 • 眼紅色，腳粉紅色。 • 嘴粗直、紅色甚醒目。 	1. 飛行時可見其腰至尾羽白色，尾羽末端黑色： 蠣鴿 (<i>Haematopus ostralegus</i>)  王健得 攝
大型直立涉禽、嘴扁平呈杓形		
通常出現於海岸或漁塭地帶	<ul style="list-style-type: none"> • 體大致白色，腳黑色。 • 繁殖羽頭及胸長出黃色飾羽。 	1. 臉白色，體型較大約 85cm：白琵鷺(<i>Platalea leucorodia</i>) 2. 嘴尖、眼先至眼周圍裸皮黑色，體型較小約 75cm：黑面琵鷺(<i>Platalea minor</i>)

四、空域常見的〈黑白鳥〉，燕子或雨燕

環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
約〈麻雀〉大小或略小，體長約 13-14cm		
常在空中或水域盤旋	<ul style="list-style-type: none"> • 體背黑色或近黑色，腹面甚白色。 	1. 中高海拔山區，腰白色，喉至腹面全白：東方毛腳燕(<i>Delichon dasypus</i>) 2. 平地水域附近，背面深灰褐色近黑，腹面白、有T型頸圈：灰沙燕(<i>Riparia riparia</i>) 3. 十分普遍常見，翼呈鐮刀形，體暗灰褐色近黑，腰及喉部白色：小雨燕(<i>Apus nipalensis</i>)
比〈白頭翁〉大，體長約 20cm，翼鐮刀形，體修長		
常在空中盤旋	<ul style="list-style-type: none"> • 體灰褐色近黑色。 • 尾羽分叉明顯，腰、喉白色，腹有白色細紋路。 	1. 叉尾雨燕(<i>Apus pacificus</i>)
比〈白頭翁〉大，體長約 21-23cm，翼鐮刀形，體粗壯		
常在空中快速飛行	<ul style="list-style-type: none"> • 體灰褐色近黑色。 • 尾粗呈方形。 • 背中央灰白色。 • 尾下覆羽白色明顯。 	1. 喉白色且界線明顯： 白喉針尾雨燕(<i>Hirundapus caudacutus</i>) 2. 喉灰，界線不明顯： 灰喉針尾雨燕(<i>Hirundapus cochinchinensis</i>)

五、離外島、迷鳥或稀有鳥種

環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
比〈鴿子〉更大，體長約 45cm，粗壯		
分布於金門，常單獨、成對或小群活動於樹林地帶或站立於建築物上。	<ul style="list-style-type: none"> 體黑色，後頸、上背、頸側到胸有白色頸圈。 	玉頸鴉(台灣為迷鳥)。注意，東方寒鴉之淡色型體型較小<35cm，嘴短，白色頸圈延伸至腹部；亦為迷鳥(金門為稀有冬候鳥)。
比〈珠頸斑鳩〉小，體長約 22-25cm，粗壯		
出現於樹林地帶，喜於底層覓食。	<ul style="list-style-type: none"> 體黑色，腳肉褐色。 	<ol style="list-style-type: none"> 嘴黑色，眉白色明顯，下腹至尾下有白色細紋：白眉地鸛♂(<i>Zoothera citrina</i>) 嘴黃色，眼圈黃色，腹部白色有黑色粗斑點：烏灰鸛♂(<i>Turdus cardis</i>) <p>烏灰鸛·王嘉雄 攝</p>
大型直立涉禽，比〈蒼鷺〉更大，體長約 140cm		
出現於濕地，有時會進入旱地或開闊草地	<ul style="list-style-type: none"> 體通常白色，腳黑，頸黑色，嘴直、黃色。 次級與三級飛羽黑色，頭頂紅色。 	1.丹頂鶴(<i>Grus japonensis</i>)
大型直立涉禽、嘴長而下彎，比〈大白鷺〉小，粗壯		
通常出現於海岸或濕地	<ul style="list-style-type: none"> 體大致白色、腳黑色。 嘴、頭至頸黑色。 	<ol style="list-style-type: none"> 飛羽末端黑色，飛行時呈黑邊，停棲時可見體後端黑色，體型較大約 75cm：埃及聖鸛(<i>Threskiornis aethiopicus</i>，為籠中逸鳥) 飛羽不帶黑色，停棲時體全白，體型較小約 70cm：黑頭白鸛(<i>Threskiornis melanocephalus</i>)
大型直立涉禽、嘴長直、甚粗，比〈蒼鷺〉更大		
單獨出現於海岸或濕地，偶有 2 隻以上的記錄	<ul style="list-style-type: none"> 體大而壯。 體色黑白對比明顯。 腳紅色。 	<ol style="list-style-type: none"> 體較大，約 130cm，嘴黑、體白，飛羽黑色：東方白鸛(<i>Ciconia boyciana</i>) 體略小，約 100cm，嘴紅、背黑、腹白色：黑鸛(<i>Ciconia nigra</i>)



圖由左至右：丹頂鶴·李俊輝 攝。東方白鸛·謝季恩 攝。黑鸛·李文化 攝