

# 鳥類的花花世界 Part.02

整理／楊玉祥

## 我是〈紅帕帕〉的大紅鳥

台語俗諺說：「紅水黑大扮」，這句話是否也左右了您的審美觀念呢？沒錯！在野外賞鳥的過程中，要是突然遇見一隻紅通通的鳥，肯定會馬上吸引所有賞鳥人的目光！但是，在台灣形形色色的野鳥當中，要突然瞥見一隻全身通紅或是有明顯紅色調的鳥，還真的是不太容易的呢！由於紅色調十分顯眼，容易招致異樣的眼光，在動物

身上若具有明顯紅色調，則通常具有警告或宣示的意味，如台灣可見的野鳥中，有許多只有公鳥或繁殖羽色才看得見明顯的紅色調。茲將常見的、身上具有明顯紅色調的野鳥整理如下，供鳥友們在野外辨識時參考。

翻石鷗 · 楊玉祥 攝



環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
<b>一、水邊的鳥</b>		
於草叢中靜止不動或蹣手蹣腳地緩慢行動，偶而會快速飛出。  栗小鷺 · 李文化 攝 →	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 40cm。</li> <li>全身栗褐色。</li> <li>有喉央線。</li> <li>飛行時翼略寬長、尾短。翼上無黑色橫帶。</li> </ul> 	<b>栗小鷺♂ <i>Ixobrychus sinensis</i></b> 母鳥或幼鳥背暗褐色，有許多細雜斑，腹面有縱紋；黃小鷺體黃褐色有黑色頭冠，飛行時可見黑色翼帶，此為與栗小鷺的區別。
驚覺性極高，通常於水邊草叢或泥灘走動覓食。受到驚嚇時很少飛走，通常跑入草叢之中躲藏。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 19 cm，尾甚短。</li> <li>嘴鉛灰色、眼紅色，腳紅色明顯。</li> <li>背面褐色，臉、腹面栗紅色。</li> <li>尾下覆羽淡色，有黑色橫紋。</li> </ul>	<b>緋秧雞 <i>Porzana fusca</i></b>
群聚性高，數隻、成小群至上百隻出現於沿海地帶。有以嘴翻動石塊以啄食底下食物的行為。為局部普遍的冬候鳥、過境鳥	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 23 cm，背甚紅有金屬光</li> <li>嘴粗、黑色呈錐型，腳略粗短、橘紅色。</li> <li>頭頂有縱紋，臉至腹面白色有黑色花紋，十分明顯。</li> </ul>	<b>翻石鷗(夏羽) <i>Arenaria interpres</i></b> 飛行時，可見背中央、肩、腰部及翼帶白色十分顯眼。
普遍的過境鳥、冬候鳥，數隻或小群出現於沿海地帶，偶而大群出現，喜歡與其他水鳥混群。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 20 cm。</li> <li>頭、頸至腹面甚紅，嘴長、黑色且明顯下彎，腳略長，黑色。</li> </ul>	<b>彎嘴濱鷗/許鷗(夏羽) <i>Calidris ferruginea</i></b> 冬羽背灰色、腹白，與黑腹濱鷗相似，需注意嘴、腳的長度。
稀有的過境鳥，通常單獨或數隻出現，少與其他水鳥混群。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 35 cm，腳長，甚高，外型粗壯。</li> <li>嘴長、直、黑色，腳亦粗、長。</li> <li>頭頂有縱斑，背面全略帶紅色，臉至腹面甚紅。</li> </ul>	<b>半蹼鷗(夏羽) <i>Limnodromus semipalmatus</i></b> 為全球易危鳥種；在台灣另有相似種長嘴半蹼鷗分布，較常見。長嘴半蹼鷗的腳黃色，嘴亦帶黃色，體色為淡紅褐色，不甚紅。

環境或習性	初步判斷特徵	考慮哪些鳥種(亞種)及辨別
不普遍的過境鳥、冬候鳥，數隻或小群出現於沿海地帶，喜歡與其他水鳥混群。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 23 cm，略粗壯。腳黃綠色。</li> <li>嘴略長、黑色。頭頂有縱斑、背灰褐色、覆羽軸斑紅色，臉至腹面有明顯磚紅色。</li> </ul>	紅腹濱鷸(夏羽) <i>Calidris canutus</i> 冬羽全身灰褐色，與大濱鷸十分相似，需注意。
<b>二、陸上的鳥</b>		
常成對或成群出現於開墾地，偶有成千隻的大群。 常在地面行走覓食，遇驚擾則飛至樹上	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 23 cm，頭小、體胖。</li> <li>腳短、黑色，頭灰色，後頭有黑色頸環，體紅褐色，飛羽黑色。</li> <li>尾灰色，外側末端白色。</li> </ul>	紅鳩♂ <i>Streptopelia tranquebarica</i> 紅鳩母鳥之體色為灰褐色，背面顏色較濃。
稀有過境鳥。 單獨或數隻出現於海岸林等地帶。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 14 cm，嘴粗短。</li> <li>頭至上胸、背栗褐色，十分亮眼。腹部金黃色、腹側有細縱紋。</li> </ul>	綉鴉♂ <i>Emberiza rutila</i>
高山地帶普遍分布的留鳥，通常單獨或成對出現，習性不太懼怕人類。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 15 cm，嘴粗短，鉛灰色。</li> <li>腳紅色，體紫紅色，眉線白色，十分明顯。飛羽及尾羽黑色、三級飛羽飛羽末端白色。</li> </ul>	台灣朱雀/酒紅朱雀♂ <i>Carpodacus formosanus</i> 原歸類於酒紅朱雀的一個亞種，2011年時獨立成爲一個新種。
普遍分布於低至中海拔山區，通常成對或小群活動於樹林，冬季時會集結成上百隻。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 13 cm，稍瘦長。</li> <li>額、頭頂至背灰黑色，頰至喉部灰色。翼斑、尾羽外側及腹面橙紅色十分明顯。</li> </ul>	灰喉山椒鳥♂ <i>Pericrocotus solaris</i> 母鳥體色暗色部分大致上與公鳥類似，唯以鮮亮的黃色取代了公鳥的橙紅色。
不普遍的留鳥，通常成對或小群活動於低海拔丘陵或山區樹林地帶及林緣。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 25 cm，略壯，眼白色</li> <li>嘴、腳鉛灰色，頭及飛羽黑色，體背至尾羽鮮紅色。♂腹面鮮紅色，♀腹面淡色有縱斑。</li> </ul>	朱鸚 <i>Oriolus traillii</i> 朱鸚·陳侯孟 攝
<b>三、猛禽</b>		
普遍冬候鳥，常出現於沿海或開墾地等空曠地區，偶而出現於都市的公園、學校。 覓食時有明顯的空中定點振翅之飛行習性。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 33 cm，略瘦長。♀體背為紅褐色，有斑點。飛羽黑色、尾羽有次末端黑帶、末端白色；♂頭、尾羽灰色其餘似♀。腹面紅褐色較淡有縱紋。飛行時翼尖長、尾細長。</li> </ul>	紅隼 <i>Falco tinnunculus</i>
普遍過境鳥，春、秋兩季過境期數量很多。少數個體會選擇在台灣度冬。	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 50 cm，體背紅褐色，臉灰色，眉線白色明顯，喉白色有喉央線，胸褐色，腹有橫紋。</li> <li>飛行時翼狹長，末端稍尖，尾短，翼下無明顯斑紋。</li> </ul>	灰面鵟鷹(成鳥) <i>Butastur indicus</i> 灰面鵟鷹·李俊輝 攝
迷鳥級，普遍分布於東南亞之水域，台灣近年偶有零星記錄	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 48cm，嘴灰綠色、腳黃色，頭至後頸、胸白色有細縱紋，其餘栗紅色。</li> </ul>	栗鳶 <i>Haliastur Indus</i> 飛行時翼寬長顯得稍壯。