

# 鳥類的花花世界 Part.03

整理／楊玉祥

## 我是一隻小綠鳥



您有沒有過「明明聽見了五色鳥唧唧的叫聲，找啊找啊卻找不到鳥，突然牠跳動了一下，喔.....原來在那裡啊！」的經驗呢？鳥類的羽色千變萬化，有的鮮艷，有的樸素，其中，以綠色與褐色是較佳的保護色，而帶有綠色羽色的鳥兒們，常常棲息於樹林或活動於森林邊緣地帶，身上的羽色提供絕佳

的偽裝。在這些小綠鳥中，有些習性十分隱秘，令人不易找到牠的蹤影，如：綠啄木；但也有不少平易近人的鳥種，如白環鸚嘴鵯、綠繡眼、五色鳥...等。以下為

鳥友們整理常見的一些綠色鳥種之辨識重點。



綠畫眉·柯木村 攝

鳥種	特徵	習性、特有性、保育等級
綠啄木 <i>Picus canus</i> Gray-faced Woodpecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 26-30 公分。</li> <li>頭灰色，頭頂至後頸有黑縱紋，眼先、腮線黑色；♂額紅色。體黃綠色，腹面較淡，尾羽有黑色橫斑。飛羽黑，有白斑。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>II 級保育類。</li> <li>棲息於中、高海拔森林。</li> <li>繁殖季會發出嘹亮、似哨音的連續單音叫聲。</li> </ul>
綠鳩 <i>Treron sieboldii</i> White-bellied Pigeon vs. 紅頭綠鳩 <i>Treron formosae</i> Whistling Green-Pigeon	<p><b>相似處：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 33 公分。嘴灰藍色、腳紅。</li> <li>體黃綠色；♂翼上有紫紅色塊。</li> </ul> <p><b>相異處：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>紅頭綠鳩♂額較紅；外側尾羽為黑色。</li> <li>綠鳩下腹至尾下覆羽白色，軸斑黑且明顯。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>紅頭綠鳩為 II 級保育類。</li> <li>兩者通常都棲息於森林或林緣地帶。紅頭綠鳩侷限於南部、東部及綠島、蘭嶼之平地至低海拔；綠鳩分布之範圍及海拔較廣。</li> </ul>
綠繡眼 <i>Zosterops japonicus</i> Japanese White-eye	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 11 公分。</li> <li>嘴、腳黑色，額、喉及尾下覆羽黃色，眼圈白色明顯，背面黃綠色，腹面淺灰色。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>出現於平地至中海拔林緣地帶；成對或小群出現，有時會有數十隻之大群。</li> </ul>
綠畫眉 <i>Erpornis zantholeuca</i> White-bellied Erpornis	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 11 公分。</li> <li>上嘴暗色、下嘴肉色，腳肉色。</li> <li>背黃綠色，頭上有冠羽，腹面淺灰色。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>出現於低、中海拔樹林或林緣。常成對或小群混於繡眼畫眉等鳥群中。</li> </ul>
五色鳥 <i>Megalaima nuchalis</i> Taiwan Barbet	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 22 公分。</li> <li>嘴黑色甚粗厚，腳灰色，趾為兩前兩後對趾型。頭部藍色，眉線黑色，眼先有紅點，喉黃色，體綠色，腹面顏色略淡。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>出現於平地至中海拔樹林地帶，在公園及校園內常見。</li> <li>為台灣特有種。</li> </ul>
白環鸚嘴鵯 <i>Spizixos semitorques</i> Collared Finchbill	<ul style="list-style-type: none"> <li>體長約 20 公分。</li> <li>嘴黃色、厚短而下彎似鸚鵡，腳紅褐色。</li> <li>頭黑色，頰部有白色細紋與白頸圈相連，體綠色，腹面略淡。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常單獨、成對或小群出現於平地至中海拔林緣。</li> </ul>

鳥種	特徵	習性、特有性、保育等級
綠啄花 <i>Dicaeum minullum</i> Plain Flowerpecker vs. 紅胸啄花♀ <i>Dicaeum ignipectum</i> Fire-breasted Flowerpecker	<b>相似處：</b> • 體長約 8 到 9 公分，嘴細略下彎。 • 體橄綠色，腹面較淡。 <b>相異處：</b> • 綠啄花嘴較長，腹面較淡色。 • 紅胸啄花♀背略帶藍色，尾下覆羽白色	• 皆常單獨、成對或小群活動於山區的森林中。 • 紅胸啄花分布海拔比綠啄花高。
棕面鶯 <i>Abroscopus albogularis</i> Rufous-faced Warbler	• 體長約 9 公分。 • 臉淡紅褐色，頭側線黑色，喉白色、有黑斑。背面橄綠色，腹面白色。	• 常單獨至小群出現於中、高海拔森林地帶。
火冠戴菊鳥 <i>Regulus goodfellowi</i> Flamecrest	• 體長約 9 公分。 • 臉白色，頰至後頸灰色，頭上、眼圈及顴線黑色，體黃綠色有白色細翼帶，腹面綠色較淡。♂頭頂中央有紅褐色冠羽；♀黃色冠羽較小。	• 台灣特有種，Ⅲ級保育類。 • 單獨至小群出現於中、高海拔森林中，常與山雀科鳥類混群。
極北柳鶯 <i>Phylloscopus borealis</i> Arctic Warbler vs. 黃眉柳鶯 <i>Phylloscopus inornatus</i> Yellow-browed Warbler	<b>相似處：</b> • 體長約 11-12 公分。 • 眉黃白色，上嘴暗色，下嘴不全黃。背橄綠色，通常 2 條白色翼帶。 <b>相異處：</b> • 黃眉柳鶯體型較圓胖，眉線前端達上嘴基，翼帶與覆羽對比明顯、三級飛羽羽緣白色。黃眉柳鶯腹面黃白，極北柳鶯腹面污白。	• 皆為過境、冬候鳥。 • 常單獨或數隻出現於樹林地帶。
佛法僧 <i>Eurystomus orientalis</i> Dollarbird	• 體長約 27-33 公分。 • 嘴、腳黃色，頭黑色，背面藍綠色，飛羽及尾羽暗色，初級飛羽有藍白色斑塊。	• 過境期常出現於海岸至低海拔樹林。
栗喉蜂虎 <i>Merops philippinus</i> Blue-tailed Bee-eater	• 體長約 29 公分。 • 嘴黑色、尖長略下彎。頭上至背部黃綠色，腰至尾羽藍色，中央尾羽長，形成尾叉。過眼線黑色明顯，喉栗紅色，腹面黃綠色。	• 金門地區普遍的夏候鳥，築巢於沙質的田埂及壁面上。



圖由左至右依序為：1.紅胸啄花♀·郭偉修 攝。2.綠啄花·王健得 攝。3.黃眉柳鶯·柯木村 攝。4.極北柳鶯·李俊輝 攝