

# 鳥類的花花世界 Part.05

整理／楊玉祥


## 黃色系的鳥類

黃鸝 ·  
陳侯孟攝



在野外觀察鳥類時，黃色是一種吸睛、重要的辨識指標，例如鮮黃的灰喉山椒鳥♀只要一出現，自然而然就會成為眾人的目光焦點。話雖如此，以前曾見過黃澄澄的黃鸝飛進樹林後，卻怎麼找都找不到，原本以為牠已飛遠，沒想到往前走了幾步又把牠驚飛，這才發現：原來牠一直隱身在那堆轉黃的樹葉後面。根據這次經驗，原來亮眼的黃色也可以是保護色！茲將數種黃色鳥種辨識的方式整理如下，以供鳥友們參考，建議先依觀察到的鳥種之黃色部分(通常是背、腹顏色對比，黃鸝全身均大致黃色)區分成幾個大類後，再觀察細部特徵來區分。

鳥種	細部特徵	習性
<b>全身大致黃色，黑色集中於翼及尾部</b>		
黃鸝 <i>Oriolus chinensis</i> Black-naped Oriole	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 25 cm，嘴紅色、腳鉛灰色，頭至身體幾近全黃，有黑色粗過眼線、相連接於後頭，翼及尾羽主要為黑色有黃色斑塊。</li> <li>♂羽色較鮮亮，過眼線粗，幼鳥腹淡色有粗縱斑</li> </ul>	稀有留鳥、過境鳥，分布及繁殖於平地、低海拔樹林。屬於 I 級保育鳥類。
<b>腹面黃色，活動於山區樹林中、上層的山雀</b>		
黃山雀 <i>Macholophus holsti</i> Yellow Tit	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 13 cm，頭部冠羽長、黑色並與前頭中央線及過眼線相連，末端至後頸中央白色。</li> <li>背深藍色，三級飛羽及尾羽末端白。臉、腹面黃色，♂泄殖孔周圍黑色。</li> <li>台灣唯一臉頰沒有大白斑的山雀。</li> <li>台灣特有種，分布於山區森林地帶，以中海拔較常見。屬於 II 級保育鳥類。</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">李文化 攝</p>
青背山雀 <i>Parus monticolus</i> Green-backed Tit	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 13 cm，頭黑色，頰、後頭中央白色。</li> <li>背青綠色，飛羽、尾羽藍色，翼上有 2 條白色翼帶，腹面黃色，喉至腹中央黑色。</li> <li>台灣特有亞種，屬於 III 級保育鳥類。</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">李俊輝 攝</p>
<b>背面帶綠色、腹黃，單獨或成群活動的小型鳥</b>		
黃雀 <i>Spinus spinus</i> Eurasian Siskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 12 cm，臉至胸黃色，背黃綠色、腰黃色，翼黑色且有 2 條黃色粗翼帶，尾羽黑色，外側尾羽基部黃色。♂黃色較鮮亮，前額至頭頂黑色、喉黑色，下腹白色，僅腹側有縱紋。♀頭及背部黃綠色有暗色縱斑，腹淡色有縱紋。</li> </ul>	冬候鳥，於樹林地帶度冬，平地至中海拔山區均有可能見到。

鳥種	細部特徵	習性
火冠戴菊鳥 <i>Regulus goodfellowi</i> Flamecrest	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 10 cm，♂頭中央有紅、黃色長冠羽，兩側有粗黑線，臉白色，眼圈、顴線黑色，耳羽灰色延伸至後頸，背黃綠色，飛羽及尾羽暗色，有一條白色翼帶，外側尾羽黃綠色。腰及腹面黃色。</li> <li>♀冠羽不明顯。</li> </ul>	台灣特有種，分布於中、高海拔森林地帶。屬於Ⅲ級保育鳥類。
<b>背黑色，腹黃色有翼帶、翼斑的鶇</b>		
黃眉黃鶇♂ <i>Ficedula narcissina</i> Narcissus Flycatcher	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 13 cm，頭至背面黑色，眉線黃色，有一條白色粗翼帶，腰黃色，喉至上胸橘紅色，腹黃色。</li> </ul>	過境鳥，出現於樹林地帶。
白眉鶇♂ <i>Ficedula mugimaki</i> Korean Flycatcher	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 13 cm，頭至背面黑色，眉線白色，有一個白色大塊長形翼斑，腰黃色，喉橘紅色，胸、腹部黃色。</li> </ul>	過境鳥，出現於樹林地帶。
<b>腹面黃色、體型修長</b>		
灰喉山椒鳥♀ <i>Pericrocotus solaris</i> Gray-chinned Minivet	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 18 cm，頭部灰色，喉至頰淺灰，背灰綠色，翼及尾灰黑色，翼斑、外側尾羽及腹面亮黃色。</li> </ul>	分布於低、中海拔森林地帶中、上層。
東方黃鶇鶇（夏羽） <i>Motacilla tschutschensis</i> Gray-chinned Minivet	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 17 cm，背綠色，翼黑色有 2 條細橫帶，尾羽甚長為黑色，三級飛羽及尾部外側白色，腹面黃色。</li> </ul>	過境、冬候鳥，常於空曠處的地面或路面覓食及活動。
西方黃鶇鶇（夏羽） <i>Motacilla flava</i> Western Yellow Wagtail	<ul style="list-style-type: none"> <li>東方黃鶇鶇頭灰色或灰藍色，有白色眉線；西方黃鶇鶇眉線黃色。</li> </ul>	 <p style="text-align: right;">李文化 攝</p>
灰鶇鶇（夏羽） <i>Motacilla cinerea</i> Gray Wagtail	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 17 cm，頭至背面灰色，眉線白色，飛羽、尾羽黑色，三級飛羽及尾部外側白色，腹面黃色。</li> <li>夏羽喉黑色、顴線白色明顯。</li> <li>灰鶇鶇腳為肉黃色，而 2 種黃鶇鶇腳黑色。</li> </ul>	過境、冬候鳥，常於空曠處的地面或路面覓食及活動。
<b>背紅、腹黃，對比明顯的鶇科</b>		
銹鶇 <i>Emberiza rutila</i> Chestnut Bunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 14 cm，♂頭至背面栗紅色，飛羽及尾羽暗色，胸以下鵝黃色，腹側有縱斑。</li> <li>♀身上顏色較暗，有許多暗色縱紋。</li> </ul>	過境鳥，喜出現於草地或灌叢地帶。
金鶇 <i>Emberiza aureola</i> Yellow-breasted Bunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 14 cm，♂額、臉至喉部黑色，背面栗褐色有栗紅色斑，翼上有一個白色斑塊，喉有黃及栗色頸圈，胸以下黃色，腹側有縱紋。♀背淡栗褐色有縱紋，眉、喉以下不鮮明黃色，腹側有縱紋。</li> </ul>	過境鳥，喜出現於草地或灌叢地帶。
黑頭鶇♂ <i>Emberiza melanocephala</i> Black-headed Bunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 16 cm，額至頭頂至頰黑色，背栗褐色，翼黑色羽緣白色，尾羽暗褐色，外側尾羽白色。頸側、喉至腹面亮黃色。</li> </ul>	過境鳥，喜出現於草地或灌叢地帶。