

高雄市境內外來種 鳥類 選介

文／楊玉祥

生物若經由人為主動或是非主動的引入 (introduce)，而出現在自然分布與擴散範圍外的區域，即成為外來種 (alien species)。部分的外來種若能夠適應野外的環境，並在自然環境下建立自行繁衍的族群，就稱為入侵種 (invasive species, Wilcove et al. 1998)。

國際間及國內專家學者不斷地研究、探討，以證實入侵外來種對生態的影響，例如 Wilcove (1998) 便指入侵外來種所造成的原生物種滅絕，以生物多樣性的減低僅次於棲息地破壞因素。而根據已入侵外來種動物處理順序評估系統 (梁世雄 2008) 指出，在進口外來寵物鳥種有 290 種，有 93 種逃逸野外成為引入鳥種，30 種有在野外繁殖的記錄，由此可知寵物鳥是入侵外來種最大來源。在這些寵物鳥中，以椋鳥科 (8 種)、鸚鵡科 (6 種) 及文鳥科 (6 種) 為主；其中椋鳥科可說是目前台灣地區種類及數量最多、分布極為廣泛的入侵生物類群，8 種中已有 5 種在野外建立穩定族群；家八哥被列為第 1 名，屬於應優先處理的入侵外來鳥種，至於次優先的鳥種均屬於八哥科的葡萄胸椋鳥、栗尾椋鳥、九官鳥、林八哥、烏領椋鳥、輝椋鳥及白尾八哥等 6 種。根據「高雄市民飼、棄養外來種寵物的認知與行為之研究」(林新沛、吳明峰 2007)，民眾對於飼養寵物的相關法令所知甚少，



白尾八哥 · 朱海文 攝

也顯見有關宣導不足。在高雄市的放生外來種寵物方面，約有三成的飼主表示曾經放生過，未來會放生或棄養的也可能在兩成以上。這樣的數字令人十分擔憂，也顯示出民眾對於外來物種在生態上的危害不了解甚至不重視，



白腰鸚鵡 · 王健得 攝

這從過去鳥會執行外來鳥種調查與移除工作時遇到的質疑或反對的意見可見一斑。

目前在高雄市境內的外來鳥種，以體型較大、族群量大且較適應於都會區內生存的八哥科 (椋鳥科) 為最普遍常見，如白尾八哥、家八哥、輝椋鳥...等；其次，則為於特定區域或特定環境較常見的鳥種，如斑馬鳩 (衛武營、中都濕地)、大陸畫眉 (壽山、半屏山) 及白腰鸚鵡 (壽山、大龜山等丘陵地帶)；體型嬌小的梅花雀科及雀科，如白喉文鳥、白頭文鳥以及黃額絲雀...等則相對不易被發現，但數量不少。此外，還有很多寵物鳥已經逸逃到野外中，目前狀況仍不甚明確，如：各種鸚鵡、紅耳鸚、鸚鵡、爪哇雀及灰喜鵲...等，均曾在高雄市的野外環境出現過。茲將高雄市的外來鳥種辨識整理如下，並附上中華鳥會 2013 年所頒布之台灣鳥類名錄之中外來種 (名錄中稱為引進種) 的部份 (附表一) 及在台灣野外已有穩定繁殖紀錄但是尚未有足夠證據證明已在台灣連續超過十年或族群無明顯擴散的引進種 (附表二，鳥類名錄附錄二)。



斑馬鳩
鍾卓良 攝

常見外來鳥種分類及辨識法

鳥種	細部特徵/備註說明
綠頭鴨 Mallard <i>Anas platyrhynchos</i>	<ul style="list-style-type: none"> 雁鴨科，大型，體長約 60cm。♂頭綠色、頸圈白色、胸前栗褐色，身體大致灰白色。喙黃色。♀全身褐色有縱紋。台灣有野生冬候鳥族群(稀有) 有人工繁殖飼養逸出之個體，各地公園或濕地內有放養。
埃及聖鸛 Sacred Ibis <i>Threskiornis aethiopicus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鸛科，大型，體長約 65-89cm。嘴黑、長而下彎。 頭至頸黑色，體白。飛羽末端黑色，收褶於尾上顯眼。 永安濕地、高屏溪口及茄苳濕地曾有記錄。
戈芬氏鳳頭鸚鵡 Tanimbar Corella <i>Cacatua goffiniana</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鳳頭鸚鵡科，小型，體長約 30cm。 喙、腳及全身白色，眼先粉紅、翼下及尾下淺黃色。
葵花鳳頭鸚鵡 <i>Cacatua galerita</i> Sulphur-crested Cockatoo	<ul style="list-style-type: none"> 鳳頭鸚鵡科，中大型，體長約 45-50cm。 嘴、腳黑色，冠羽黃色甚長，全身白色，翼下及尾下黃色。
白鳳頭鸚鵡 White Cockatoo <i>Cacatua alba</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鳳頭鸚鵡科，中型，體長約 45cm。 喙、腳灰黑色，全身白色，翼下及尾下覆鮮黃色。
紅頸綠鸚鵡 Rose-ringed Parakeet <i>Psittacula krameri</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鸚鵡科，中型，體長約 37-43cm。上喙鮮紅而下喙黑色，眼圈紅色，全身綠色，尾羽甚長、綠色，外側尾羽腹面黃色，腹面顏色較淡。 ♂有細頸圈，前半部為黑色，後半部粉紅色略粗。
斑馬鳩 Zebra Dove <i>Geopelia striata</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鳩鴿科，小型，體長約 19cm。額、臉至喉藍灰色，過眼線細、白色，背面至頸側大致褐色、密布橫紋，胸中央粉紫色，腹淡色。 高雄斑馬鳩族群集中於衛武營及中都濕地公園周邊。
灰喜鵲 Azure-winged Magpie <i>Cyanopica cyanus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鴉科，中型，體長約 34-38cm。 頭上半部黑色，體灰色、腹面較淡，翼及尾藍灰色。 高雄左營區的國訓中心、茄苳濕地及南星計畫區曾有記錄。
大陸畫眉 Hwamei <i>Garrulax canorus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 噪眉科，小型，體長約 20-25cm。眼圈白色並向後延伸成眼線，體栗褐色、頭及胸有細紋。金門有野生族群(留鳥)。 壽山及半屏山有穩定族群，半屏山尤其易見，有與台灣畫眉雜交的問題
鵲鴝 Oriental Magpie-Robin <i>Copsychus saularis</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鵲科，小型，體長約 19-21cm。♂背面藍黑色，翼黑有白色長白斑，腹部及尾羽兩側白色，黑白對比明顯。♀為灰色對比。 中都濕地、左營眷村、南星計畫區、高屏溪口、援中港、中寮山曾發現
白腰鵲鴝 White-rumped Shama <i>Copsychus malabaricus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鵲科，小型，體長約 25-30cm。♂背藍黑色，腰部白色，中央尾羽長、全黑，外側尾羽白色，腹面橘紅色。♀略小於♂，背灰色，尾亦略短，腹面橘色較淡，腹中央較白。 壽山有很大族群，各淺山丘陵可能均已遭入侵
輝棕鳥/菲律賓輝棕鳥 Asian Glossy Starling <i>Aplonis panayensis</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 20cm。 成鳥眼睛紅色，全身黑色有綠色光澤。 亞成鳥背面顏色較黯淡，腹淡色有粗縱斑。
九官鳥 Common Hill Myna <i>Gracula religiosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 30cm。 嘴橘紅色，腳黃色。全身黑色，眼至後頭有黃色肉垂。

葡萄胸棕鳥 Vinous-breasted Starling <i>Acridotheres burmannicus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 21-23cm。 嘴、腳橘黃色，頭至頸淡色，過眼線黑色，背暗褐色，腹面酒紅色。
白尾八哥 Javan Myna <i>Acridotheres javanicus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 21-23cm。嘴、腳黃色，眼黃色，體暗灰色。 頭、翼及尾羽黑色，翼上有白色斑塊，尾羽末端及尾下覆羽白色。
林八哥 Jungle Myna <i>Acridotheres fuscus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 22-24cm。 嘴黃色、基部藍色、腳黃色。頭黑色，嘴基上方有冠羽，體黑褐色，翼上有白色斑塊，尾羽末端及尾下覆羽白色。
家八哥 Common Myna <i>Acridotheres tristis</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 25cm。嘴、腳、眼周圍裸皮黃色。 頭黑色、體褐色。翼上有白色斑塊，尾羽末端及尾下覆羽白色。
黑領／烏領棕鳥 Black-collared Starling <i>Gracupica nigricollis</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科，小型，體長約 30cm。 嘴黑色、腳淡色。頭白色、眼周圍裸皮黃色明顯，頸圈黑色甚寬，背面大致暗灰色間雜白色，腹面大致為白色。
灰頭／栗尾棕鳥 Chestnut-tailed Starling <i>Sturnia malabarica</i>	<ul style="list-style-type: none"> 八哥科・小型，體長約 17-22cm。嘴前端黃色、基部藍色，腳肉色。 頭至腹面灰白色，背灰色，外側尾羽栗紅色。(亦有腹面栗紅色之亞種)
橙頰梅花雀 Orange-cheeked Waxbill <i>Estrilda melpada</i>	<ul style="list-style-type: none"> 梅花雀科，小型，體長約 10cm。嘴紅色。 頭至腹面灰白色，頰橙紅色，背及翼褐色 腰至尾上覆羽紅色。 橙頰梅花雀・辛啟昭 攝
白喉文鳥 Indian Silverbill <i>Euodice malabarica</i>	<ul style="list-style-type: none"> 梅花雀科，小型，體長約 10cm。喉至腹面污白色。 背面褐色，腰至尾上覆羽白色，尾羽栗褐色、中央尾羽黑色略長而尖。
橫斑梅花雀 <i>Estrilda astrild</i> Common Waxbill	<ul style="list-style-type: none"> 梅花雀科，小型，體長約 12cm。 嘴紅色，與紅色過眼線相連，全身大致褐色有細橫紋，喉污白色。
白頭文鳥 <i>Lonchura maja</i> White-headed Munia	<ul style="list-style-type: none"> 梅花雀科，小型，體長約 12cm。 嘴銀灰色，頭米白色，喉至胸淺黃，身體大致為栗褐色。
爪哇雀 Java Sparrow <i>Lonchura oryzivora</i>	<ul style="list-style-type: none"> 梅花雀科，小型，體長約 17cm。嘴紅色，腳肉色。 頭黑、頰白色大塊明顯，眼圈紅色，背至胸灰色，尾黑色，腹粉紅色。
黃額絲雀 Yellow-fronted Canary <i>Serinus mozambicus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 雀科，小型，體長約 13cm。 ♂頭綠色，額黃色，過眼線黑色，臉頰黃帶黑色條紋，背面棕色有斑紋，腹面黃色。 ♀顏色較黯淡。 紅耳鶇・鍾卓良 攝
紅耳鶇 Red-whiskered Bulbul <i>Pycnonotus jocosus</i>	<ul style="list-style-type: none"> 鶇科，小型，體長約 19cm。 頭黑色、有冠羽，眼下有紅斑塊、頰白色明顯，背面大致褐色，腹面淡色，尾下覆羽紅色。
黑喉噪眉 Black-throated Laughingthrush <i>Garrulax chinensis</i>	<ul style="list-style-type: none"> 噪眉科，小型，體長約 30cm。 臉至喉黑色，額頭有白色橫線，頰有大塊白斑，體棕褐色。(亦有頰無白斑的亞種)
針尾維達雀 <i>Vidua macroura</i> Pin-tailed Whydah	<ul style="list-style-type: none"> 維達雀科，♂31cm(繁殖期)尾羽甚長。喙紅色，頭上半至背面黑色，尾羽甚長而寬，腹面白色。♀背面褐色有斑紋，眉白色甚長，腹面淡色。

附表一、2013 台灣鳥類名錄中之引進種

資料來源：2013 台灣鳥類名錄

科名	中文名	學名	英文名	台灣	馬祖列島	金門列島
雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	冬、不普/引、稀	過、不普	冬、不普
雉科	環頸雉	<i>Phasianus colchicus</i>	Ring-necked Pheasant	特亞、稀/雜、不普	無	引、普
鸚鵡科	埃及聖鸚	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Sacred Ibis	引、不普	引、稀	無
鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon	引、普	無	無
	灰斑鳩	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared-Dove	引、稀	無	迷
鴉科	灰喜鵲	<i>Cyanopica cyanus</i>	Azure-winged Magpie	引、稀	無	無
噪眉科	大陸畫眉	<i>Garrulax canorus</i>	Hwamei	引、不普	迷	留、稀
鶇科	鶇鶇	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie-Robin	引、稀	留、不普	留、普
八哥科	輝椋鳥	<i>Aplonis panayensis</i>	Asian Glossy Starling	引、不普	無	無
	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	Javan Myna	引、普	無	引、稀
	林八哥	<i>Acridotheres fuscus</i>	Jungle Myna	引、不普	引、稀	無
	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna	引、普	引、稀	引、稀
	黑領椋鳥	<i>Gracupica nigricollis</i>	Black-collared Starling	引、稀	無	留、不普
	灰頭椋鳥	<i>Sturnia malabarica</i>	Chestnut-tailed Starling	引、稀	無	無
梅花雀科	橙頰梅花雀	<i>Estrilda melpoda</i>	Orange-cheeked Waxbill	引、不普	無	無
	白喉文鳥	<i>Euodice malabarica</i>	Indian Silverbill	引、不普	無	無

附表二、在台灣野外已有穩定繁殖記錄但未有足夠證據證明已在台灣連續超過十年或無明顯擴散的引進種

科名	中文名	學名	英文名	台灣	馬祖列島	金門列島
雉科	藍孔雀	<i>Pavo cristatus</i>	Indian Peafowl	無	無	稀
鳩鴿科	斑馬鳩	<i>Geopelia striata</i>	Zebra Dove	稀	無	無
鳳頭鸚鵡科	戈芬氏鳳頭鸚鵡	<i>Cacatua goffiniana</i>	Tanimbar Corella	稀	無	無
	葵花鳳頭鸚鵡	<i>Cacatua galerita</i>	Sulphur-crested Cockatoo	稀	無	無
	白鳳頭鸚鵡	<i>Cacatua alba</i>	White Cockatoo	稀	無	無
鸚鵡科	紅色吸蜜鸚鵡	<i>Eos bornea</i>	Red Lory	稀	無	無
	彩虹吸蜜鸚鵡	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Rainbow Lorikeet	稀	無	無
	紅領綠鸚鵡	<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet	稀	無	無
鴉科	紅嘴藍鵲	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Blue Magpie	稀	無	無
鶇科	紅耳鶇	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Red-whiskered Bulbul	稀	無	無
噪眉科	黑喉噪眉	<i>Garrulax chinensis</i>	Black-throated Laughingthrush	稀	無	無
	白頰噪眉	<i>Garrulax sannio</i>	White-browed Laughingthrush	稀	無	無
鶇科	白腰鶇	<i>Copsychus malabaricus</i>	White-rumped Shama	稀	無	無
八哥科	九官鳥	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna	稀	無	無
	葡萄胸椋鳥	<i>Acridotheres burmannicus</i>	Vinous-breasted Starling	稀	無	無
唐納雀科	紅冠臘嘴鸚	<i>Paroaria coronata</i>	Red-crested Cardinal	稀	無	無
雀科	黃額絲雀	<i>Serinus mozambicus</i>	Yellow-fronted Canary	稀	無	無
織布鳥科	非洲金織雀	<i>Ploceus subaureus</i>	African Golden-Weaver	稀	無	無
	黑頭織雀	<i>Ploceus cucullatus</i>	Village Weaver	稀	無	無
梅花雀科	橫斑梅花雀	<i>Estrilda astrild</i>	Common Waxbill	稀	無	無
	白頭文鳥	<i>Lonchura maja</i>	White-headed Munia	稀	無	無
	爪哇雀	<i>Lonchura oryzivora</i>	Java Sparrow	稀	無	無
維達雀科	針尾維達雀	<i>Vidua macroura</i>	Pin-tailed Whydah	稀	無	無

資料來源：2013 台灣鳥類名錄附錄二