

# 認識台灣特有種鳥類 25 種



黃山雀·王健得 攝

整理／楊玉祥

猶記得1997年加入鳥會時，當時，台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等，1991)裡收錄僅有458種鳥，我們這些菜鳥花了一番心力好不容易地才將台灣特有種鳥類14種背的倒背如流；不久之後，台灣叢樹鶯、台灣畫眉的相繼加入，都是讓賞鳥人很開心的消息；然而，鳥類研究不斷地精進，鳥類分類當然也會隨著調整，台灣鳥類的名錄上陸續地出現新紀錄種和新的台灣特有種，如今，2014年台灣鳥類名錄(草稿，中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會，2014)已收錄有626種鳥類，台灣特有種也列有25種了。以下為各位鳥友介紹這25種鳥類，也為大家簡單地整理了一下其發現年份，以及後來新增的11種台灣特有種「升格」的時間。

## 台灣山鵪鶉 *Arborophila crudigularis* · Taiwan Partridge · 雉科

- \* 體長約25cm，腳紅色。雌雄同型，大致為尾短、背褐色、胸藍色的小型雞，眼周圍裸皮紅色。
- \* 1864年4月由Robert Swinhoe發現(林文宏，1997)。



柯木村 攝



李文化 攝

## 藍腹鵪鶉 *Lophura swinhoii* · Swinhoe's Pheasant · 雉科

- \* 體長♂約70cm、♀約55cm，腳紅色。♂全身大致為黑藍色、長尾，臉部裸皮紅色，身上有亮藍色光澤，頭冠、背、中央尾羽白色，肩羽栗紅色；♀身上大致褐色有斑紋，外側尾羽栗紅色，腹部斑紋為V字型。
- \* 1862年4月在台北淡水山區由Robert Swinhoe發現(林文宏，1997)。

柯木村 攝



## 黑長尾雉 *Syrmaticus mikado* · Mikado Pheasant · 雉科

- \* 體長♂約90cm、♀約55cm，腳鉛灰色。♂全身大致黑藍色、尾羽甚長有橫節，身上有亮藍色光澤，臉部裸皮紅色；♀身上大致褐色有斑紋。
- \* 1906年2月在南投及嘉義由Walter Goodfellow發現(林文宏，1997)。



母鳥·王健得 攝



公鳥·陳世明 攝

**五色鳥** *Megalaima nuchalis* · Taiwan Barbet · 鬚鶯科

- \* 體長約20cm，外型略肥短，嘴粗壯、黑色。雌雄同型，全身大致綠色，額及下頷黃色、眉線黑色，頰至上喉藍色、眼先有紅色斑點及喉下方有紅色橫線。
- \* 1861年由Robert Swinhoe發現(林文宏，1997)。中華鳥會於2008年台灣鳥類名錄中「關於台灣的畫眉及五色鳥之分類地位，我們則與台灣鳥類誌一致，採用李壽先老師等人研究(Li et al. 2006, Feinstein et al. 2008)的建議。」列為台灣特有種，中文名改為「台灣擬啄木」(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2008)；2009年台灣鳥類名錄中又改回「五色鳥」(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2009)。



王健得 攝

**台灣藍鵲** *Urocissa caerulea* · Taiwan Blue-Magpie · 鴉科

- \* 體長約65cm，嘴、腳紅色。頭黑色、體藍色、尾長，眼黃色明顯，中央尾羽甚長、藍色、末端白色，外側尾羽近末端黑色、末端白色。
- \* 1862年3月在台北淡水由Robert Swinhoe發現(林文宏1997)。



陳世明 攝

**黃山雀** *Parus holsti* · Yellow Tit · 山雀科

- \* 體長約13cm。頭冠甚高而明顯至背部黑色、翅及尾羽藍色，外側尾羽白色，臉及腹面黃色。
- \* 1894年在玉山由瑞典人霍斯特發現(林文宏，1997)。



李文化 攝

**烏頭翁** *Pycnonotus taivanus* · Styan's Bulbul · 鶇科

- \* 體長約18cm。頭頂黑色、背灰色、翅綠色、臉及腹面淡色。顎線黑色、嘴基部有橘紅色斑點。
- \* 1893年在台灣南部由Frederick William Styan發現(林文宏，1997)。



李俊輝 攝

**火冠戴菊鳥** *Regulus goodfellowi* · Flamecrest · 戴菊科

- \* 體長約9cm。頭頂黑色、中央黃色，可張開呈頭冠，♂頭冠前半部紅色；臉白色，眼外圍及顎線黑色，後頸至頸側灰色，背面黃綠色，腹面黃色。
- \* 1906年1月由Walter Goodfellow在玉山發現(林文宏，1997)。



柯木村 攝

## 台灣鷓眉 *Pnoepyga formosana* · Taiwan Cupwing · 鷓眉科

\* 體長約9cm，尾甚短。背暗褐色，密佈斑點，腹面各羽黑色、羽緣白色形成鱗狀斑。

\* 1909年由菊池米太郎於阿里山發現。原中文名鱗胸鷓鶉(王嘉雄等, 1991)，中華鳥會於2008年台灣鳥類名錄中採用小鷓眉，2010年改為台灣鱗胸鷓鶉(中華鳥會鳥類紀錄委員會, 2008、2010)；2011年台灣鳥類名錄「2010年12月20日公布的Clements世界鳥類名錄6.5版認定台灣有22種特有種，除台灣畫眉與五色鳥外，增加了台灣白喉噪眉(*Garrulax ruficeps*)、大彎嘴(*Pomatorhinus erythrocnemis*)、小彎嘴(*Pomatorhinus musicus*)、台灣鷓眉(*Pnoepyga formosana*)、灰頭花翼(*Alcippe formosana*)等5種新的台灣特有種。Clements 6.5版對這些台灣特有種的認定變動，主要是依據 Niger Collar (2006)的意見。」將其列為台灣特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會, 2011)。



李俊輝 攝

## 台灣叢樹鶯 *Locustella alishanensis* · Taiwan Bush-Warbler · 蝗鶯科

\* 體長約13cm，尾略長。全身褐色、腹面較淡，喉部有細斑。

\* 1917年6月在阿里山由日本人素木得一及菊池米太郎發現(林文宏, 1997)。原中文名褐色叢樹鶯(王嘉雄等, 1991)，由於Rasmussen等於2000年認定為台灣特有種，故改為「台灣叢樹鶯 *Bradypterus alishanensis*」。2014年台灣鳥類名錄(草稿)依循Clements世界鳥類名錄6.8版「台灣叢樹鶯由*Bradypterus*屬改為*Locustella*屬」(中華鳥會鳥類紀錄委員會, 2014)。



李文化 攝

## 褐頭花翼 *Fulvetta formosana* · Taiwan Fulvetta · 鸚嘴科

\* 體長約11cm。頭部、後頸灰色，眼周圍白色，背部至尾羽灰褐色，翼橙色、初級飛羽有灰白色細邊，喉淡色有縱斑。

\* 1906年1月由Walter Goodfellow於玉山發現(林文宏, 1997)。中文名或作褐頭花翼(王嘉雄等, 1991)、灰頭花翼(林文宏, 1997，中華鳥會鳥類紀錄委員會, 2008、2010)，2011年台灣鳥類名錄依據2010年12月20日公布的Clements世界鳥類名錄6.5版列為台灣特有種，2012年將中文名改為「褐頭花翼」(中華鳥會鳥類紀錄委員會, 2012)。



李文化 攝

## 冠羽畫眉 *Yuhina brunneiceps* · Taiwan Yuhina · 繡眼科

\* 體長約12cm，頭上冠羽暗褐色，過眼線、顴線與頸側有一弧形線斑相連，背部橄欖灰色，飛羽暗褐色，腹面大致為灰白色，尾下覆羽雜有栗褐色羽毛。

\* 1906年1月在南投山區由Walter Goodfellow發現(林文宏, 1997)。



鍾卓良 攝



## 棕噪眉 *Ianthocincla poecilorhyncha* · Rusty Laughingthrush · 噪眉科

- \* 體長約28cm，尾略長。全身大致栗褐色，下腹灰色，尾下覆羽白色。嘴基及眼周圍藍色，甚醒目。
- \* 1861-1862年由Robert Swinhoe於台北淡水發現。2012年台灣鳥類名錄「Clements世界鳥類名錄6.6版將棕噪眉 (*Garrulax poecilorhynchus*, Rusty Laughingthrush) 改為台灣特有種，認定台灣有23種特有種。此外，本委員會亦接受李壽先老師等人的研究建議(Wu et al. 2011)，將台灣的酒紅朱雀族群 (*Carpodacus formosanus*, Taiwan Rosefinch) 視為台灣特有種」；2014年台灣鳥類名錄(草稿)「台灣白喉噪眉、棕噪眉、黑喉噪眉3種由*Garrulax*屬改*Ianthocincla*屬」(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2012、2014)。



王健得 攝

## 台灣白喉噪眉 *Ianthocincla ruficeps* · Rufous-crowned Laughingthrush · 噪眉科

- \* 體長約28cm，尾略長。頭上栗紅色，背至尾羽褐色，尾羽外側末端白色。喉至上胸白色，胸有褐色橫帶，腹黃白色。
- \* 1861-1862年由Robert Swinhoe發現。2011年台灣鳥類名錄依據2010年12月20日公布的Clements世界鳥類名錄6.5版，列為台灣特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2011)。



陳世明 攝

## 台灣畫眉 *Garrulax taewanus* · Taiwan Hwamei · 噪眉科

- \* 體長約24cm，背面大致為暗褐色，腹面淡褐色，背面及胸部有黑褐色細縱紋，尾羽有黑褐色細橫紋。
- \* 1858年由Robert Swinhoe於宜蘭蘇澳發現。2008台灣鳥類名錄「關於台灣的畫眉及五色鳥之分類地位，我們則與台灣鳥類誌一致，採用李壽先老師等人研究(Li et al. 2006, Feinstein et al. 2008)的建議。」列為特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2008)



李文化 攝

## 台灣噪眉 *Trochalopteron morrisonianum* · White-whiskered Laughingthrush · 噪眉科

- \* 體長約28cm，頭上橄灰褐色，背面橄褐色，飛羽鼠灰色，羽緣金黃色，眉斑、顎線白色明顯，腹面橄褐色，尾下覆羽栗褐色。
- \* 1906年1月由Walter Goodfellow在玉山發現(林文宏，1997)



李俊輝 攝

### 白耳畫眉 *Heterophasia auricularis* · White-eared Sibia · 噪眉科

\* 體長約24cm，頭上黑色，眉斑白色延伸至耳羽、後頭側為其特徵，背面、喉部至上胸大致灰黑色，尾上覆羽橙褐色，尾羽長，黑褐色，外側尾羽末端灰白色，翼黑色，初級飛羽基部灰白色。

\* 1864年3月由Robert Swinhoe發現(林文宏，1997)。

李文化 攝



### 黃胸薺眉 *Liocichla steerii* · Steere's Liocichla · 噪眉科

\* 體長約17cm，全身大致橄欖綠色，頭上灰黑色，尾羽橄欖綠色，末端黑色，額黃色，三級飛羽栗褐色，臉部外緣雜有橙黃色羽毛，眼前下方有一黃色斑。

\* 1873年由Joseph Beal Steere發現(林文宏，1997)。

李俊輝 攝



### 紋翼畫眉 *Actinodura morrisoniana* · Taiwan Barwing · 噪眉科

\* 體長約18cm，頭部、背面暗栗褐色，肩暗灰色，尾羽黑褐色，有栗褐色橫斑，飛羽暗褐色有栗褐色橫斑，前頸至上胸灰褐色雜有污白色羽毛，腹以下栗褐色雜有淡色羽毛。

\* 1906年1月由Walter Goodfellow在玉山發現。

郭志豪 攝



### 台灣紫嘯鶇 *Myophonus insularis* · Taiwan Whistling-Thrush · 鶇科

\* 體長約30cm，全身黑色而有藍色或紫色光澤，眼紅色。

\* 1861年3月在台北淡水由Robert Swinhoe發現(林文宏，1997)。

李文化 攝



### 栗背林鴝 *Tarsiger johnstoniae* · Collared Bush-Robin · 鶇科

\* 體長約13cm，雄鳥背面黑色，肩羽橙紅色，飛羽暗褐色，眉斑白色，下頸有紅色頸環，胸褐色，腹以下白色；雌鳥背部大致為暗褐色，眉斑較不明顯。

\* 1906年1月在南投山區及玉山由Walter Goodfellow發現(林文宏，1997)。

左圖公鳥、右圖母鳥 · 陳世明 攝



### 繡眼畫眉 *Alcippe morrisonia* · Gray-cheeked Fulvetta · 噪眉科

- \* 體長約12cm，頭至上背灰色，眼圈白，下背至尾羽、翼黃褐色，腹淡黃褐色。
- \* 1861-1862年由Robert Swinhoe發現。2014年台灣鳥類名錄(草稿)「本名錄和2013年台灣鳥類名錄同樣依循Clements世界鳥類名錄，不同的是2013年鳥類名錄依循Clements世界鳥類名錄6.7版(Clements et al. 2012)，而本名錄依循的版本更新為6.8版(Clements et al. 2013)。在特有種方面，因為台灣的繡眼畫眉(*Alcippe morrisonia*)由特有亞種改為特有種。」列為台灣特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2014)。



朱海文 攝

### 小彎嘴 *Pomatorhinus musicus* · Taiwan Scimitar-Babbler · 畫眉科

- \* 體長約20cm。嘴略長，明顯下彎，上嘴喙深色、下嘴喙象牙白色。頭頂暗色，過眼線粗黑與白色眉斑、頰部成強烈對比。肩紅色、背栗褐色。頸側至腹有深色縱斑。
- \* 1958年6月由Robert Swinhoe於宜蘭縣蘇澳發現。2011年台灣鳥類名錄依據2010年12月20日公布的Clements世界鳥類名錄6.5版，列為台灣特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2011)。



李俊輝 攝

### 大彎嘴 *Megapomatorhinus erythrocnemis* · Black-necklaced Scimitar-Babbler · 畫眉科

- \* 體長約25cm。有台灣所有畫眉中最長、下彎最明顯的嘴喙，暗褐色。臉部沒有眉斑或過眼線，額有紅斑點。背至尾羽栗褐色。喉至上胸污白色，周圍有黑色粗縱斑。
- \* 1862年4月由Robert Swinhoe發現。2011年台灣鳥類名錄依據2010年12月20日公布的Clements世界鳥類名錄6.5版，列為台灣特有種(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2011)。



王健得 攝

### 台灣朱雀 *Carpodacus formosanus* · Taiwan Rosefinch · 雀科

- \* 體長約15cm，嘴銀灰色，腳紅色，翼及尾羽黑色，三級飛羽末端白色。♂全身暗紅色，眉斑白色；♀全身褐色，有細縱斑。
- \* 1986年由吳森雄於南投大禹嶺發現。2012年台灣鳥類名錄「Clements世界鳥類名錄6.6版將棕噪眉(*Garrulax poecilorhynchus*, Rusty Laughingthrush)改為台灣特有種，認定台灣有23種特有種。此外，本委員會亦接受李壽先老師等人的研究建議(Wu et al. 2011)，將台灣的酒紅朱雀族群(*Carpodacus formosanus*, Taiwan Rosefinch)視為台灣特有種」(中華鳥會鳥類紀錄委員會，2012)。



母鳥 · 簡廷謀 攝



公鳥 · 廖混淇 攝