

# 台灣保育類鳥種選介 第一級 瀕臨絕種

整理／楊玉祥

為保育台灣野生動物資源，政府於78年6月23日制定公布「野生動物保育法」，根據野保法第4條之條文「野生動物區分為下列二類：一、**保育類**：指瀕臨絕種、珍貴稀有及其他應予保育之野生動物。二、**一般類**：指保育類以外之野生動物。前項第一款保育類野生動物，由野生動物保育諮詢委員會評估分類，中央主管機關指定公告，並製作名錄。」保育類野生動物名錄於中華民國78年8月4日公告(行政院農業委員會(78)農林字第 8030307A 號公告)，其後經過多次修正，最後一次修正於103年7月2日公告生效(行政院農業委員會農林務字第1031700771號公告)。中華鳥會為建立台灣鳥類名錄及審查鳥類新紀錄種所成立之「中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會」，亦從2008、2010年起逐年審議、修訂更新台灣鳥類名錄，今年度之台灣鳥類名錄於7月10日公布(<http://www.bird.org.tw/index.php/works/lists>)。因保育類野生動物名錄及台灣鳥類名錄均經過多次修訂，因此特別選介了一些保育類鳥種，本期介紹第一級(瀕臨絕種)保育類鳥種，其中，遺鷗(*Ichthyaetus relictus*)亦為2014年台灣鳥類名錄所新增之鳥種喔！



黃鷗 · 陳侯孟 攝

## 東方白鸕 *Ciconia boyciana* · Oriental Stork · 鸕科

- \* 稀有冬候鳥，繁殖於中國東北，於長江下游、朝鮮半島、日本等地度冬。
- \* 大型涉禽，體長約110cm，嘴黑色，甚粗、長直，腳長、紅色。眼淡色、眼圈紅色，全身白色，飛羽黑色。

李文化 攝



## 黑面琵鷺 *Platalea minor* · Black-faced Spoonbill · 鷺科

- \* 不普遍冬候鳥。繁殖於朝鮮半島、遼東半島外海島嶼，於日本、中國東南海岸、台灣、香港及東南亞等地度冬。
- \* 大型涉禽，約70cm，體粗壯。嘴黑色甚長、先端寬扁呈飯匙狀，腳長、黑色，眼紅色，臉黑色與嘴相連，全身白色。繁殖羽：有冠羽，黃色，胸前有黃色胸帶連至後頸。非繁殖羽全身白、無冠羽及胸帶。



繁殖羽 · 李文化 攝



非繁殖羽 · 柯木村 攝

## 卷羽鵜鶘 *Pelecanus crispus* · Dalmatian Pelican · 鵜鶘科

- \* 迷鳥，繁殖於東歐至中亞，於非洲北部、希臘、土耳其、印度及中國東南沿海度冬。
- \* 大型游禽，體長可達160至180cm，十分壯碩。嘴甚直長，喉囊黃色明顯，全身灰白色、翼尖黑色，頭上有捲曲冠羽。



鄭政卿 攝

## 白枕鶴 *Grus vipio* · White-naped Crane · 鶴科

- \* 迷鳥，繁殖於西伯利亞、蒙古、中國北部及東北，於華中、華南、日本、朝鮮半島等地度冬。
- \* 大型涉禽，體長約120至150cm，嘴長直、灰色至黃色，腳亦長、淡紅色。頭頂至後頸白色，臉、頰至側頸、前頸黑色，眼周圍紅色裸皮明顯，身體大致灰褐色，翼上覆羽灰白色。



蘇貴福 攝

## 白頭鶴 *Grus monacha* · Hooded Crane · 鶴科

- \* 迷鳥，繁殖於西伯利亞、蒙古及中國東北，於日本、中國東部度冬。
- \* 大型涉禽，體長約90至100cm，嘴長直、黃色，腳亦長、灰色，眼先黑色。頭至頸白色，成鳥眼紅色，頭頂紅色，體大致灰黑色。幼鳥虹膜褐色，嘴淡紅色，頭、頸淡黃褐色。



鄭政卿 攝

## 丹頂鶴 *Grus japonensis* · Red-crowned Crane · 鶴科

- \* 迷鳥，分布於東北亞，繁殖於中國東北、西伯利亞及日本，於華北、華中及朝鮮半島度冬。
- \* 大型涉禽，體長約140至150cm，嘴長直、暗黃色，腳亦長、暗色。頭頂紅色，臉至頸黑色，次級及三級飛羽黑色，眼後至後頭及身體其餘部分為白色。



李文化 攝

**遊隼** *Falco peregrinus* · Peregrine Falcon · 隼科

\* 不普遍冬候鳥及過境鳥，稀有留鳥。遊隼是一種全世界均有分布的猛禽，有多個亞種。

\* 中型猛禽，體長約50cm，翼展約90至110cm，是台灣可見最大型且唯一體型粗壯的隼，翼寬、末端尖，尾中等長、扇形，飛羽及尾羽腹面有許多細橫斑。成鳥頭暗色、鬚斑粗而明顯，背面藍灰色，腹面大致白色、胸有暗色斑點，腹部有明顯橫紋。幼鳥背面灰褐色、各羽有淡色羽緣，腹面淡色有縱斑。



鄭政卿 攝



朱海文 攝

**林鵟** *Ictinaetus malayensis* · Black Eagle · 鷹科

\* 稀有留鳥，分布於東南亞和南亞的巴基斯坦、印度和斯里蘭卡、台灣和中國。

\* 大型猛禽，體長約70至80cm，翼展約180cm，飛行時翼甚寬長而呈方型，基部較窄，外側初級飛羽形成的飛指7枚甚長、明顯上翹。全身黑褐色。



朱海文 攝



**白肩鵟** *Aquila heliaca* · Imperial Eagle · 鷹科

\* 稀有過境鳥，繁殖於歐亞大陸北方，於非洲、中國東南部、香港及印度等地度冬。

\* 大型猛禽，體長約80cm，翼展約180-210cm，飛行時翼甚寬長而呈方形，外側初級飛羽形成飛指7枚略長，尾扇形甚短，遠觀為一隻黑色、頭略長的鵟屬猛禽。成鳥全身大致黑褐色，頭頂至後頸黃褐色，肩羽具白斑。



王健得 攝

**熊鷹** *Nisaetus nipalensis* · Mountain Hawk-Eagle · 鷹科

陳世明 攝

\* 稀有留鳥，分布於喜馬拉雅山區、斯里蘭卡、中南半島、中國南部、海南島、台灣及日本。

\* 大型猛禽，體長約70至80cm，翼展約140至160cm，飛行時翼甚寬長、後緣圓突明顯，外側初級飛羽形成的飛羽7枚略短，尾長呈扇型，飛羽及尾羽橫斑甚多而明顯，腳甚粗壯、跗蹠被毛。成鳥頭至頸、背面褐色，頭有冠羽，腹面有深色橫斑。幼鳥體淡色，飛行時可見翼窗。



鍾金男 攝



## 白尾海鵰 *Haliaeetus albicilla* · White-tailed Eagle · 鷹科

- \* 稀有冬候鳥，繁殖於歐亞大陸北方，南歐、北非、日本、朝鮮半島、中國東南沿海、印度北部度冬。
- \* 大型猛禽，體長約80至100cm，翼展達200至220cm，飛行翼甚寬長而呈方型，外側初級飛羽形成飛指7枚略長，尾白色略短呈楔形。成鳥全身褐色、翼上覆羽有明顯淡色羽緣。幼鳥全身有許多淡色羽毛形成雜斑，尾羽外緣及末端黑色。



陳世明 攝



李俊輝 攝

## 草鴞 *Tyto longimembris* · Australasian Grass-Owl · 草鴞科

- \* 稀有留鳥，分布於印度、中國東南部、菲律賓及澳洲等地。
- \* 中型貓頭鷹，體長約35至40cm，嘴肉紅色，腳灰色，跗蹠長。臉呈心型，淡粉紅色，顏盤周圍有黑色細緣。背面暗色有蟲蠹斑，胸部褐色、腹以下白色，胸及腹部黑褐色斑點。
- \* 棲息在丘陵地草生地環境，散佈著農田、果園、竹林、聚落及次生林邊緣的淺山環境中。白天躲藏在長草叢中休息，入夜後外出覓食，以鼠類為主食，種類包括小黃腹鼠、鬼鼠、月鼠、刺背條鼠等，行蹤隱密、罕見。全台族群數量不明，林務局的保育類野生動物圖鑑估計少於50隻(林務局，2010)，台灣受脅鳥種圖鑑則估計數量少於100隻(方偉宏，2005)。
- \* 在國際上，被華盛頓公約包括整個鴞形目列為附錄II，IUCN或BirdLife則未列為受脅鳥類。草鴞在台灣面臨的主要威脅為：棲地破壞、滅鼠藥的危害、鳥網等因素，其中每年10月底—11月舉辦的全國滅鼠週活動，不但減少草鴞的食物來源，更產生毒害的威脅。高雄鳥會自2011年舉辦全國草鴞保育論壇，積極邀請全國各地學者專家和公部門，共同投入草鴞保育工作；每年舉辦草鴞保育行動平台，推動野外調查、政策修改及教育推廣等相關工作。



柯木村 攝



李文化 攝

## 諾氏鵲 *Tringa guttifer* · Nordmann's Greenshank · 鵲科

- \* 稀有的過境鳥，金門出現之紀錄較多。其繁殖於俄國，冬季遷移至日本、韓國、中國、香港及台灣、東南亞等處。
- \* 中型涉禽，約30cm，外型像極了青足鵲但略小，嘴粗、長，略上翹，黃綠色、尖端黑，腳較青足鵲短、黃色。繁殖羽：頭至背面灰色，腹面大致白色，頰至前頸、胸、脇有黑褐色斑點。非繁殖羽：臉至腹面全白。



文胤臣 攝

## 黑嘴端鳳頭燕鷗 *Thalasseus bernsteini* · Chinese Crested Tern · 鷗科

\* 馬祖有繁殖族群並曾出現於嘉義的八掌溪口，2014年出現於澎湖雞善嶼。中國大陸的山東省北部海岸、福建閩江口、菲律賓、泰國、印尼和沙勞越也曾有牠們的蹤影；2004年在浙江韭山列島發現另一處繁殖地。

\* 中型鷗科燕鷗，體長約40cm，較鳳頭燕鷗略小，嘴橙黃色、先端黑，腳黑色。繁殖羽：前額至後頭黑色，有羽冠，背淺灰色，翼外端黑色，身體其餘部分為白色。非繁殖羽：頭部黑色部分稍向後退，額白色，頭頂有黑色斑點。

與鳳頭燕鷗混群 · 蘇貴福 攝

洪福龍 攝



## 遺鷗 *Ichthyaetus relictus* · Relict Gull · 鷗科

\* 迷鳥，繁殖地集中於蒙古、哈薩克、俄羅斯和中國，其越冬地在中國天津沿海和韓國。國內僅金門於2013年出現過1次。

\* 中型鷗科，體長約40cm，略比紅嘴鷗壯。繁殖羽：嘴、腳紅色，頭黑色，背至翼上灰色，初級飛羽黑色有1大塊白斑，翼後緣、身體其它部分白色。非繁殖羽：嘴、腳轉為黑色，背至翼上灰色，翼後緣白色，各飛羽白色末端內各有1個黑斑，初級飛羽末端、尾後緣黑色，頭至頸及身體其它部分白色。



廖混淇 攝

## 黃鸝 *Oriolus chinensis* · Black-naped Oriole · 黃鸝科

\* 稀有留鳥或過境鳥。分布於印度、中國東半部、東南亞、印尼、菲律賓等地。

\* 小型鳴禽，體長約26cm，嘴桃紅色，腳灰黑色，全身大致金黃色，過眼線黑色連接於後頭、雄鳥較雌鳥粗、明顯，翼上、飛羽及尾羽黑色而有黃色斑塊。

李文化 攝



## 山麻雀 *Passer rutilans* · Russet Sparrow · 麻雀科

\* 稀有留鳥，主要分布於山區。

\* 體長約14cm，體型及外型似麻雀，雄鳥頭頂至背部磚紅色，頰部白色無黑斑；雌鳥背面褐色，有淡色眉斑。

李文化 攝

