

台灣保育類鳥種選介 第三級其他應予保育

整理／楊玉祥

根據2014年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會，2014)，屬於行政院農業委員會(2014)「保育類野生動物名錄」中第三級保育類(其他應予保育之野生動物)的鳥種共有18種，茲整理出這18種鳥種及簡單介紹，以供鳥友參考。

在18種鳥類中，有些物種被評定為三級保育之原因是族群稀少或棲地易遭破壞，如白尾鵠、鉛色水鶲棲息於山區，但是過度的開發行為及河川整治對這兩者分別造成了生存的壓力；大杓鶲主要的度冬地點在彰化大肚溪口和彰濱工業區一帶，而嘉義的鰲鼓及台南的曾文溪口也有較穩定的族群，但彰濱工業區之族群長期以來有大幅的減少。另外，有些物種則因獵捕壓力而入列，如紅尾伯勞就是大家熟知的例子，屏東楓港地區大量捕捉販售紅尾伯勞的現象，隨著野生動物保育法施行及查緝工作的落實而逐年減少，但偶而仍會傳出一些令人傷心的消息。

台灣山鶲 鳴 *Arborophila crudigularis* · Taiwan Partridge · 雉科

- * 不普遍留鳥，為台灣特有種。
- * 體長約22公分。腳紅色，背部綠褐色有黑色橫斑，翼有栗褐色斑，頭頂橄欖色，眼周圍栗褐色，頰、喉、前頸白色，頸部有黑色鱗斑，腹面鼠灰色，有白色縱線。
- * 出現於中、低海拔之樹林底層。較常出現於懸崖之裸露地，性隱蔽不易見。常發出音階漸高似「咕嚕、咕嚕、咕嚕...」之聲。



李文化 攝



李文化 攝

麻鳶 *Gorsachius goisagi* · Japanese Night-Heron · 鶲科

- * 稀有過境鳥，體長約50公分。
- * 腳暗綠色，背面栗褐色有紫色光澤，翼上較暗，有細橫紋，腹面淡色。
- * 酷似黑冠麻鳶，主要分辨法為眼先通常不藍，頭上不具明顯黑色冠羽，體上紫色光澤明顯。飛行時，翼上黑帶不似黑冠麻鳶明顯，初級飛羽及覆羽末端不白。
- * 偶而出現於海岸附近之防風林。



葉守仁 攝

大杓鶴 *Numenius arquata* · Eurasian Curlew · 鶴科

- * 不普遍的冬候鳥，體長約50–60公分。
- * 嘴甚長、明顯下彎、暗色，下嘴基淡色。背面黃褐色，腹面淡色，頭至背、頸、胸有黑色縱斑，腹側轉為縱紋；覆羽軸斑明顯，初級飛羽黑色。飛行時，可見腰至尾下白色，對比明顯。
- * 成群出現於海岸地帶。

李文化 攝



李文化 攝

琵嘴鶴 *Calidris pygmaea* · Spoon-billed Sandpiper · 鶴科

- * 稀有過境鳥。
- * 體長約15公分。嘴扁平，前端寬呈鏟型，腳黑色。
- * 繁殖羽：頭、頸至上胸栗紅色，頭頂有細縱紋，背面各羽軸斑黑色，兩側羽緣紅色、末端白色，腹面白色，胸至脇有細斑點。
非繁殖：背面灰褐色、腹面白色，甚為樸素。
- * 偶而單獨出現，通常混雜於其牠鶴科鳥種中出現於海岸、河口之泥灘



張健樂 攝

張健樂 攝

半蹼鶴 *Limnodromus semipalmatus* · Asian Dowitcher · 鶴科

- * 稀有過境鳥，體長約33–36公分。
- * 嘴長而直、黑色，腳黑色、略高。繁殖羽：頭、頸部至胸、脇紅色甚明顯，頭頂至後頸有暗色細縱紋，背、翼羽黑色軸斑與紅色、白色羽緣對比明顯。腹側亦帶紅色有明顯細橫紋。飛行時，下背、腰至尾羽密布暗色橫紋。出現於河口附近之泥灘及鹽田等地帶。



繁殖羽 · 張健樂 攝



繁殖羽 · 柯木村 攝



王健得 攝

大地鶲 *Gallinago hardwickii* • Latham's Snipe • 鶲科

大地鶲 · 陳順章 摄

- * 稀有過境鳥，體長約23–33公分。通常單獨出現於沼澤、水田等地帶。
- * 嘴長而直、綠褐色、先端漸黑。額至頭頂暗褐色有央線，臉淡褐色，過眼線暗色而細，眼後至後頸有細紋，背面黃褐色有許多斑紋，腹白色。尾羽16–18枚，中央數枚較寬，外側各羽較窄。
- * 田鶲屬之鳥種嘴均直長，體型胖，十分相似，在野外辨識上，除田鶲嘴比例較長、過眼線較粗可以區別，中地鶲、大地鶲及針尾鶲之辨識有極高難度。大地鶲除體型較大之外，羽色亦較淡，但仍建議以尾羽之數量、外側尾羽之寬窄等特徵做為絕對之判斷依據。



大地鶲 · 陳順章 摄



針尾鶲 · 陳世明 摄



中地鶲 · 王健得 摄



燕行鳥 *Glareola maldivarum* • Oriental Pratincole • 燕鶲科



李俊輝 摄

- * 普遍的夏候鳥，體長約24公分。
- * 嘴黑色基部內側紅色，背面茶褐色，尾上覆羽白色，頭至胸部黃褐色，喉乳黃色，外緣黑色，腹以下白色。飛行時，飛羽、尾羽黑色，翼下覆羽橙紅色。
- * 單獨或成群出現、繁殖於海岸附近之石礫地、旱田地帶。站立姿態挺直，飛行姿態輕巧靈活，常發出粗啞的鳴聲，並能於飛行中捕食飛蟲。



求偶 · 李文化 摄



交配 · 李文化 摄



抱卵 · 王健得 摄



育雛 · 王健得 摄



幼鳥 · 李文化 摄



亞成鳥 · 李俊輝 摄



擬傷 · 李文化 摄



成鳥 · 柯木村 摄

紅尾伯勞 *Lanius cristatus* · Brown Shrike · 伯勞科

- * 普遍過境鳥及冬候鳥。
- * 體長約18公分。嘴粗短、下勾、黑色，背面灰褐色，翼、尾羽暗褐色。雄鳥過眼線黑色寬長，頰、喉部白色，胸以下淡黃褐色；雌鳥過眼線較細，有白眉線，腹面雜有細鱗狀斑。
- * 過境期間有可能會出現於山區，主要度冬於平地之農作地、空曠地帶。喜歡停在空曠處之突出物體上，常發出粗噪之連續聲，亦會鳴唱婉轉細微的聲音。

雄鳥 · 李俊輝 攝



雌鳥 · 陳世明 攝

白眉林鶲 *Cinclidium leucurum* · White-tailed Robin · 鶲科

- * 稀有留鳥，台灣特有亞種。
- * 體長約14公分。嘴黑色，腳粉色。雄鳥：背面大致灰藍色，前額及飛羽帶黃褐色，眉線白色、長而明顯，眼先黑色，喉至腹面、尾下為一致的橙褐色；雌鳥：背面橄褐色、略帶藍色，白色眉線較窄、較淡。
- * 通常單獨出現於中海拔山區混合林底層。



雌鳥 · 王健得 攝



雄鳥 · 王健得 攝

鉛色水鶲 *Phoenicurus fuliginosus* · Plumbeous Redstart · 鶲科

- * 普遍留鳥，台灣特有亞種。
- * 體長約12公分。嘴黑色，腳褐色。雄鳥：身體大致深鉛灰色，翼黑褐色，尾上、尾下覆羽至尾羽栗褐色；雌鳥：背面鉛灰色，翼及尾羽黑褐色，尾上、尾下覆羽及尾羽外側白色，腹面羽色較淡，有鱗斑。
- * 通常單獨出現於中海拔山區混合林底層。



幼鳥 · 陳世明 攝



雄鳥 · 王健得 攝

黃腹琉璃 *Niltava vivida* • Vivid Niltava • 翠鶯科

* 不普遍留鳥，台灣特有亞種。體長約18公分。

* 嘴、腳黑色。雄鳥：背面深藍色具金屬光澤，前額、頰至喉藍黑色，喉中央至腹面橙色。雌鳥：背灰褐色略帶藍色，翼、尾上至尾羽棕褐色。

* 通常單獨、成對或小群出現於低、中海拔山區之樹林地帶。

雌鳥・李文化 攝



雄鳥・王健得 攝

白尾鶲 *Cinclidium leucurum* • White-tailed Robin • 翠鶯科

* 不普遍留鳥，台灣特有亞種。

* 體長約18公分。嘴、腳黑色。雄鳥：全身大致深藍色，臉至喉藍色，額及肩羽亮藍色，尾黑色，外側各尾羽之「外瓣基部」有一段白色，越接近中央白色比例越多。雌鳥：體大致褐色，尾羽與雄鳥一樣有白色。

* 通常單獨或成對出現於低、中海拔森林之底層。



雌鳥・陳世明 攝

雄鳥・李文化 攝

紋翼畫眉 *Actinodura morrisoniana* • Taiwan Barwing • 噪眉科

* 普遍留鳥，台灣特有種。

* 體長約18公分。頭部、背面暗栗褐色，肩暗灰色，尾羽黑褐色，有栗褐色橫斑，飛羽暗褐色有栗褐色橫斑，前頸至上胸灰褐色雜有污白色羽毛，腹以下栗褐色雜有淡色羽毛。

* 常成群出現於中、高海拔闊葉林或混合林中。會攀附或倒懸於樹枝上覓食。

陳世明 攝



煤山雀 *Periparus ater* • Coal Tit • 山雀科

* 普遍留鳥，台灣特有亞種。

* 體長約10-12公分，嘴細、短、暗色，腳鉛灰色。頭至喉黑色，頭上有冠羽，冠羽後方至後頸中央白色，頰至頸側白色甚明顯，背面藍灰色，腹面污白色。

* 單獨或小群出現於中、高海拔之針葉林或針、闊混合林之上層。

陳世明 攝



青背山雀 *Parus monticolus* · Green-backed Tit · 山雀科

- * 普遍留鳥，台灣特有亞種。
- * 體長約12-13公分，嘴細、黑色，腳鉛灰色。頭至喉及胸、腹中央至尾下黑色，後頸中央白色，頰白色甚明顯，背綠色，翼及尾羽藍灰色，腹面黃色。
- * 單獨或小群出現於中、高海拔闊葉林之中、上層。

陳世明 攝



台灣藍鵲 *Urocissa caerulea* · Taiwan Blue-Magpie · 鴉科

- * 普遍留鳥，台灣特有種。
- * 體長約64公分，嘴、腳紅色，眼黃色，頭至頸部、胸黑色，全身大致為藍色，下腹部羽色稍淡，尾羽長，末端白色，中央2根甚長，除中央2根之外，其它各尾羽中段黑色。
- * 通常成小群出現於低、中海拔闊葉林及次生林中，習性凶猛，會攻擊其他鳥類或動物。繁殖期會群體築巢、育幼。

簡廷謀 攝



飯島柳鶯 *Phylloscopus ijimae* · Ijima's Leaf-Warbler · 柳鶯科

- * 稀有過境鳥。
- * 體長約11-12公分。上嘴黑褐色、下嘴橙黃色，腳肉褐色。背面大致橄欖綠色，頭部色澤較深，眉線黃白色，白色細眼圈明顯，腹面白色，尾下淡黃色。
- * 出現於平地至低海拔山區之森林及灌叢地帶。

郭志豪 攝



火冠戴菊鳥 *Regulus goodfellowi* · Flamecrest · 戴菊科

- * 普遍留鳥，台灣特有種。
- * 體長約9公分。雄鳥：頭上黑色，中央橙紅色，背部橄綠色，腰黃色，翼、尾羽內瓣黑褐色，眼周圍黑色明顯，外緣白，頸線黑色，腹面黃色、腹中央白色。
雌鳥：頭上中央黃色。
- * 常出現於中、高海拔針葉林中、上層。雄鳥頭上冠羽偶會豎起，擅長在空中定點拍翅捕捉小蟲。

李俊輝 攝

雄鳥 · 柯木村 攝

