

台灣
鳥類史

首次於高雄被發現的鳥種

整理／楊玉祥

上篇 1860s~

據林文宏(1997)「台灣鳥類發現史」一書，台灣鳥類發現史可回溯到1854年。百餘年來有許多的鳥種首次發現的地點就在高雄，其中，最早的紀錄可說均是1860年代由英國領事也是博物學家的史溫侯(Robert swinhoe, 或譯作郇和、斯文豪等)所發表的19種鳥種(表一)。茲整理如下以供鳥友們參考。除了瞭解辨識方法外，每個鳥種發現的過程都是有趣的故事，歡迎各位鳥友們參閱「台灣鳥類發現史」一書。

燕隼 *Falco subbuteo* · Eurasian Hobby · 隼科

發現年代：1865年3月22日 · 發現者：史溫侯

發現地：Whaleback, Takow (高雄半屏山)

- * 隼科隼屬猛禽，體長約32-37cm，體型瘦長，背面大致藍灰色，有些個體有細眉線，眼周圍、耳羽及鬚斑黑色呈m字形，喉、頰至腹面白色，胸至腹有縱紋，尾下紅色。
- * 不普遍的過境鳥，飛行時翼十分狹長，末端尖，翼及尾密佈橫紋。

沈炳雄 攝



鄭政卿 攝

北雀鷹 *Accipiter nisus* · Eurasian Sparrowhawk · 鷹科

發現年代：1865年3月22日 · 發現者：史溫侯

發現地：Whaleback, Takow (高雄半屏山)

- * 鷹科鷹屬猛禽，體長約30-40cm，背面暗灰色，臉有白色眉線，肩羽有白色細斑點，尾羽有黑色橫帶。頰至腹面淡色，頰有細縱紋，胸至腹密佈橫紋。飛行時翼圓但略長，密佈細橫紋。
- * 稀有過境、冬候鳥。飛行時有6支飛指，翼及尾羽比例是台灣所有雀鷹屬猛禽中最細長者，也是唯一不論成鳥或未成鳥腹面都只有橫紋者。

陳世明 攝



鄭政卿 攝

白肩雕 *Aquila heliaca* · Imperial Eagle · 鷹科

發現年代：1865年02月 · 發現者：史溫侯

發現地：Apes' Hill (高雄柴山)

- * 鷹科鷹屬猛禽，體長約68-84cm，翼展約176-216cm。全身大致黑褐色，頭頂至後頸淡褐色，肩有明顯白斑。
- * 稀有過境鳥。飛行時翼寬長而方、有7支長指叉，尾方形而短、末端有黑橫帶。



王健得 攝

麻鷺 *Gorsachius goisagi* · Japanese Night-Heron · 鷺科

發現年代：1865年03月 · 發現者：史溫侯 ·

發現地：Takow(高雄)

- * 體長約50cm，頭至頸紅褐色，喉至胸中央有暗色央線，身體栗褐色，腹部淡色有細斑紋。
- * 稀有過境鳥。外形似常見的黑冠麻鷺但成鳥頭頂不黑，飛行時飛羽末端不白，尾羽不黑。



陳順章 攝

林三趾鶉 *Turnix sylvaticus* · Small Buttonquail · 三趾鶉科

發現年代：1869年01月 · 發現者：史溫侯

發現地：Hills about fifteen miles from Takwo(高雄15哩外的丘陵)

- * 體長約15-16cm。頭小體圓胖，嘴灰藍色，腳黃色。全身大致黃褐色有橫斑，腹部淡色。
- * 稀有留鳥，習性十分隱密。

紅冠水雞 *Gallinula chloropus* · Eurasian Moorhen · 秧雞科

發現年代：1861年 · 發現者：史溫侯

發現地：Apes' Hill (高雄柴山)

- * 體長約30-38cm。頭小體圓胖，全身黑色，額板至嘴紅色甚明顯，嘴端黃色，腳黃綠色、脛有紅斑。脇有白色橫斑，尾下兩側有大塊白斑。
- * 普遍留鳥。



亞成鳥



王健得 攝

白冠雞 *Fulica atra* · Eurasian Coot · 秧雞科

發現年代：1863年11月 · 發現者：史溫侯

發現地：Apes' Hill (高雄柴山)

- * 體長約36-39cm。頭小體圓胖，全身黑色，額板至嘴白色，腳灰綠色有瓣蹼。
- * 不普遍的冬候鳥。



李俊輝 攝

水雉 *Hydrophasianus chirurgus* · Pheasant-tailed Jacana · 水雉科

發現年代：1865年04月23日 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Takow (高雄)

- * 體長約39-58cm。頭小、頸略長，體壯，腳綠色、趾甚長可在浮葉上行走。繁殖羽頭頂至後頸金黃色有黑邊，體大致褐色，尾甚長略下彎、黑色，臉、翼白色非繁殖羽及幼鳥的羽色樸素，尾羽短。

- * 稀有的留鳥及過境鳥。

左：非繁殖羽、右：繁殖羽 王健得 攝



彩鷓 *Rostratula benghalensis* · Greater Painted-snipe · 彩鷓科

發現年代：1863年11月 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Apes' Hill(柴山)

- * 體長約23-28cm。嘴長而鈍，粉紅色。雌鳥彩色較鮮艷，頭上及背大致暗橄欖綠色有細橫紋，頭央線黃色，臉至胸栗紅色，眼周圍白色向後延伸呈粗眼線。肩羽黃色，向前延伸並與腹面白色相連。雄鳥較雌鳥樸素，背面大致黃褐色，翼上有大型黃色圓斑。普遍的留鳥，習性害羞、隱密。



李文化 攝

反嘴鷸 *Recurvirostra avosetta* · Pied Avocet · 長腳鷓科

發現年代：1861年 · 發現者：史溫侯

發現地：Apes' Hill Creek (西子灣)

- * 體長約42-45cm，嘴細長、上翹，腳長、藍灰色。體大致白色，頭上半至後頸、肩羽黑色，翼上有黑色條紋、翼末端亦黑。

- * 稀有冬候鳥。

李俊輝 攝



陳世明 攝

蠟行鳥 *Haematopus ostralegus* · Eurasian Oystercatcher · 蠟鴉科

發現年代：1861年 · 發現者：史溫侯

柯樹恩 攝



發現地：Apes' Hill Creek (高雄西子灣)

* 體長約40-47cm，嘴紅色、甚長，腳肉紅色。雄鳥背面黑色，翼角前方有白色斑與腹部白色相連。雌鳥背面黑色較淡。飛行時可見翼有大塊白斑、背中央至尾上覆羽白色，甚明顯。

* 台灣地區為稀有冬候鳥，金門地區為不普遍的留鳥。

李文化 攝



陳世明 攝



紅領瓣足鷸 *Phalaropus lobatus* · Red-necked Phalarope · 鷸科

發現年代：1861年11月 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Apes' Hill (高雄柴山)

* 體長約18-19cm，嘴細、黑色，腳灰色、有瓣蹼。繁殖羽母鳥較鮮艷，頭至背面暗灰色，耳後橙紅色並延伸至頸側，喉白色，腹面灰色有斑點。雄鳥，耳至頸側橙紅色較淡。非繁殖羽背面為淺灰色，臉至上胸甚白，眼周圍黑色明顯。

* 普遍的過境鳥。



繁殖羽 · 李俊輝 攝



非繁殖羽 · 李俊輝 攝

灰林鴿 *Columba pulchricollis* · Ashy Wood-Pigeon · 鳩鴿科

發現年代：1866年01月27日 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Fungshan Mountains (高屏山區)

* 體長約31-36cm，頭體粗壯，嘴灰綠色、基部紫紅色，腳紅色。頭灰色，後頭及頸圈乳白色有橫紋。背暗灰色，翼及尾羽暗褐色，胸以下紫灰色，越往腹部越淡。

* 不普遍的留鳥。



郭志豪 攝



柯木村 攝

綠鳩 *Treron sieboldii* · White-bellied Pigeon · 鳩鴿科

發現年代：1865年06月05日 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Fungshan Mountains (高屏山區)

- * 體長約33cm，頭小體粗壯。全身大致黃綠色，腹面較淡，飛羽及外側尾羽黑色。
- 雄鳥額沾橙色，覆羽有大片紫紅色塊。
- * 不普遍的留鳥。

簡廷謀 攝



簡廷謀 攝

黑枕藍鶲 *Hypothymis azurea* · Black-naped Monarch · 王鶲科

發現年代：1861年08月06日 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Apes' Hill、Taiwanfoo (高雄柴山、台南)

- * 體長約15-17cm，體瘦、尾長。
- 雄鳥除腹部外，全身大致寶藍色，上嘴基黑色，後頭頂有黑色圓斑，上胸有黑色窄橫帶。
- 母鳥藍色較淡，背至尾褐色，黑色部分不明顯。

- * 普遍留鳥。



李文化 攝



李俊輝 攝

小雨燕 *Apus nipalensis* · House Swift · 雨燕科

發現年代：1861年 · 發現者：史溫侯 · 發現地：Apes' Hill (高雄柴山)

- * 體長約15cm，翼狹長呈鐮刀型。體大致黑褐色，喉及腰白色，尾短、分叉淺僅略內凹。
- * 普遍留鳥。

朱海文 攝

**粉紅鸚嘴** *Sinosuthora webbiana* · Vinous-throated Parrotbill · 鸚嘴科

發現年代：1865年12月17日 · 發現者：史溫侯

發現地：Ar-kongteem(高雄岡山)

- * 體長約11-13cm，頭圓，嘴短、下彎似鸚鵡，尾長。全身大致橙紅色，背及覆羽褐色，腹以下黃褐色。

- * 普遍留鳥。

李文化 攝



陳世明 攝



黑頭文鳥 *Lonchura atricapilla* · Chestnut Munia · 梅花雀科

發現年代：1865年03月26日 · 發現者：史溫侯

發現地：Takow (高雄)

* 體長約11-12cm，嘴短呈錐型，銀色灰，腳藍灰色。全身大致栗褐色，頭至上胸、腹中央以下黑褐色。

* 稀有留鳥。台灣原生特有亞種為(*L. a. Formosana*)，但有許多引進之其他亞種族群。

張健樂 攝



灰背椋鳥 *Sturnia sinensis* · White-shouldered Starling · 八哥科

發現年代：1861年 · 發現者：史溫侯

發現地：Apes' Hill(高雄柴山)

* 體長約18-20cm，嘴藍灰色。眼灰白色，雄鳥頭至胸、背面灰色，腹以下灰白，翼及尾羽黑色、覆羽白色明顯。雌鳥身上大致淡褐色，覆羽白色較少。

* 不普遍的冬候鳥。

李文化 攝



繫放樹窗026

南星計畫區鳥類繫放報告2014.9/18-2015.4/18

文、圖／鄭政卿



藍尾鶇

南星計畫區2014年秋過境候鳥及度冬鳥類繫放，從2014年9月18日至2015年4月18日止，執行了7個月共10次的繫放工作，計繫放到10科14種83隻次共70隻，平均8.3隻/次，感謝本年度協助繫放工作的張進隆、劉國銘、王麗貞、王麗雅、黃潔如、李立方、丁皎等鳥友，高雄鳥會繫放團隊從2008年至今已完成7個年度808隻次的鳥類繫放工作，這個工作仍然會持續，因為無論是鳥類的基礎研究或面臨開發時，只有長期的監測累積的足夠資料，才能證明一切。

回顧本年度的繫放工作，繫放最多隻次的月份，分別為2014年9月18日的18隻及12月28日的13隻，最少的月份為2015年3月1日的2隻。最早南遷及最晚北返繫放到的鳥種皆是紅尾伯勞；明顯利用南星度冬繫放到的鳥種則為白腹鶇及黃尾鶇，黃尾鶇有3隻各回收3次橫跨3個月，白腹鶇有1隻次回收3次橫跨4個月；最久回收則是黑枕藍鶇的跨季回收記錄(2014.04.13-2014.12.28)。有趣的繫放記錄是首次繫放到的淡腳柳鶇數量高於極北柳鶇，其他較少見的鳥種有山鵲鶇、白背鶇、白腹琉璃、藍尾鶇等，其實南星還有一些在草叢及低矮冠叢的鳥種並未被繫放到，如大葦鶇、野鶇、遠東樹鶇及5月時北返的蝗鶇等，因為人手不足，因此亟需新血的加入，如果您有意願貢獻一己之力，歡迎您與繫放團隊聯繫！2015年秋過境候鳥及度冬鳥類繫放工作將會於9月開始，目前繫放團隊執行的是鳳山水庫繁殖鳥繫放調查，也歡迎您的參與！