

# 河鳥 鳥名的由來

文、圖／蘇貴福



《爾·雅翼》中並沒有關於河鳥的記載，但由河鳥在中國的廣泛分布來看，照理應該會有一些記載才是，但相關記載幾乎闕如。推測原因可能是河鳥大多棲息在山區，與人們生活較為疏離有關。

臺灣也有河鳥，依周鎮《臺灣鄉土鳥誌》所述，「河鳥」為日系外來名，16世紀後期已有此鳥名；使用漢字名之河鳥，最早見於17世紀末期之本草古籍《本草食鑑》（人見必大，1697），以及《大和本草》（貝原益軒，1709）。並說明河鳥的臺灣鄉土鳥名叫做「水汀噹」<sup>1</sup>；水汀噹棲息於清澈溪流山澗河谷附近，大都佇立於溪邊或在溪中岩石上覓食活動，是以其生態環境為名。為鄉土味濃厚的可愛溪澗山鳥<sup>1</sup>。

經查，日本在安土桃山時代（1568年-1603年）即有「かはがらす」之名，及「さはがらす」的別名<sup>2</sup>。對應的漢字即「河鳥」、「川鳥」、「川鴉」等。其中，「川鳥」也是植物名，應留意。由此可知，河鳥早期是被當成「河川的烏鴉」，主要還是其羽色深褐如茶或如巧克力，乍見時有如小一號的黑色烏鴉，出現在河川，故被稱做「河鳥」。

河鳥科的鳥類全世界有五種：河鳥（中國名稱；或稱為白喉河鳥 White-throated Dipper、歐洲河鳥；*Cinclus cinclus*）、白帽河鳥（*Cinclus leucocephalus*）、褐河鳥（Brown Dipper；*Cinclus pallasii*）、美洲河鳥（*Cinclus mexicanus*）及赤喉河鳥（*Cinclus schulzi*）。臺灣所稱之河鳥即褐河鳥。中國的河鳥則有河鳥（中國名稱或稱白喉河鳥）及褐河鳥兩種；前者分布於中國西部海拔2400-4250公尺的山區，後者分布於中國大部分區域海拔300-3500公尺的山區。

河鳥身長21-23公分，算是本事高強的溪澗鳥類，具有能走、能飛、能潛的三棲本領。記得第一次在七家灣溪畔遇到河鳥的情形，當時我在芒草叢旁邊守候，結果牠突然從溪裡冒出來，跳上溪石，還上、下蹺著尾巴做「蘿蔔蹲」的動作，不禁令人莞爾。背景溪水映著晨曦，極美！也生趣盎然，印象極為深刻！

河鳥能夠在湍急的溪流中覓食，靠著雙腳有極強的「抓地力」，羽毛有極佳的「防水性」（潑水性），而且低空飛行的能力也很好。由於喜好清淨溪流，屬於環境指標性鳥類。此外，河鳥還有特別的白色眼瞼，以及由下往上伸展的瞬膜，利於在水面下活動時之觀察<sup>3</sup>。

下次當您在清澈的溪澗遇到牠時，除了想起「水汀噹」之名外，相信也會另眼看待！

註1：《臺灣鄉土鳥誌》周鎮著，p250

註2：《鳥名の由來辭典》柏書房，p105

註3：《臺灣野鳥手繪圖鑑》蕭木吉主撰·

李政霖繪圖，p286-287

河鳥幼鳥