

大尖山 植物介紹

文、圖／凌明裕

雲林縣的古坑咖啡產於華山地區，日據時代從巴西引進咖啡豆，選擇在台東、花蓮、瑞穗、高雄、南投惠蓀林場等地種植，古坑地區因日照、雨量十分充沛，咖啡甘甜、香濃不苦澀，而變成「御用咖啡」～獻給日本天皇的貢品。華山村是雲林縣的後花園，擁有大尖山山明水秀的宜人景色。大尖山又名雲嘉大尖山、華山大尖，位於古坑鄉佳林村與嘉義縣梅山鄉龍眼村的交界處。大尖山是濁水溪支流清水溪與北港溪支流大湖口溪的分水嶺，一等三角點，山頂視野遼闊，俯瞰雲嘉平原及草嶺雲海。



拖鞋蘭

由國道3號北上梅山交流道，銜接162號縣道、台3線省道至梅山，再續接149號線道33公里至福華宮。福華宮主祀康元帥神明，昔日華山鄉野僻處，蠻煙瘴氣，疫癟猖獗，是為壓境守護神。登山步道主要有3條：① 龜仔頭線：由149華山接雲208線，取4-1、4-2古道至二尖山往大尖山。② 竹仔苓線：由149線27公里轉嘉義梅山鄉龍眼村，由竹仔苓起登。③ 蛭棋坪線：由149線福華宮取華山10-1步道出發，經10-2、10-3雲頂咖啡接10-4步道，再接華山教育農園接10-5步道上大尖山。福華宮展示販售有樹勢蒼勁、型態各異的青檜、姬檜、龍鳳柏、雪花檜、黃金檜、黃金石化檜、臥檜、斑葉銀龍柏、藍柏、黃珠杉、石化檜、紫杉、龍珠杉、斑葉龍柏、真柏、武藤雲邊桂、腋唇蘭、虎頭蘭、拖鞋蘭、報歲蘭等。

華山教育農園10-5步道海拔685公尺—大尖山海拔1305公尺屬孟宗竹植物社會

全程砂岩石階，長3公里花費120分鐘，穿

越鐵達尼巨岩、筆直的孟宗竹林及3號雲林縣警告牌。停車場有稜果榕、水麻、月桃、青楓、紅楓、構樹及巴西鐵樹。巴西鐵樹(*Dracaena fragrans*)其屬名意指雌龍，又稱龍樹，民間流傳栽種好方位，盛開芳香白花，會帶來好兆頭、好運連連。其它有白肉榕、橢圓線蕨、楓港柿、山櫻花、筆筒樹、阿拉比咖啡、大葉楠、風輪菜、甜柿、馬拉巴栗、樟、側柏。水壺型雕像前，有絲柏的宮粉梅，曹雪芹著「紅樓夢」詠紅梅花得“紅”字：「桃未芳菲杏未紅，衝寒先喜笑東風。魂飛庾嶺春難辨，霞隔羅浮夢未通。綠萼添妝融寶炬，縞仙扶醉跨殘虹。看來豈是尋常色，濃淡由他冰雪中。」

拾階穿越產業道路上六腳亭，海拔710公尺，右側有90年5月設置的中寮—嘉民3路170號高壓電塔，一旁種植了一片水杉(*Metasequoia glyptostroboides*)；1939年，三木茂博士發現水杉樹葉化石，屬中生代白堊紀及新生代，廣泛分布於北半球，後證實為第四紀冰期倖存物



巴西鐵樹



水杉



鷗蔓

種，只分布於中國湖北與重慶交界的利川、石柱、龍山，但最近農委會調查外來入侵物種，水杉是資料庫之一，從稀有變成廣泛種，民眾一窩蜂搶種。其它有川上氏月桃、龍眼、冇骨消、姑婆芋、象草、烏心石、虎婆刺、虎尾蘭、朴樹、土牛膝、香楠、鵝掌柴、觀音座蓮、九芎、梅；藤本植物有絡石、華南薯蕷、小花蔓澤蘭和4月鷗蔓，繖形花冠幅形，帶暗紫紅色，是琉球青斑蝶、姬小紋青斑蝶之食草。

眺望台海拔910公尺，右側俯瞰華山149道路蜿蜒曲折，梅山、永光、竹坑村落羅列，古坑服務區的紅色屋脊與劍湖山世界摩天飛輪相互輝映。崖邊的大葉楠新春嫩芽搭配水同木頂芽火紅，周遭則是隨風飄逸的五節芒花。平台植物有野桐、馬藍、山香圓、五掌楠、三角西番蓮、腎蕨、田代氏澤蘭、水黃麻、小葉桑、薄葉艾納香、賊仔樹、野牡丹等。1號雲林縣警告牌「下雨時注意攀登安全，小心落石」順著綠色欄杆來到鐵達尼巨石，海拔1063公尺，平台上又有海州常山(*Clerodendrum trichotomum*)複聚繖花序，花萼由綠轉紫紅，花冠純白淡香，但亦有臭牡丹之稱呼。探討其纖維素含量78.3，纖維長度700–900 μm ，製漿率達40%，紙質強度與闊葉喬木相近。其它有台灣山桂花、牛奶榕、咬人貓、水麻、紫柄苧麻、水雞油、大葉溲疏、中原氏鼠李、錫毛鐵線蓮、台灣山黑扁豆、黑果馬廸兒、老荊藤和同屬台灣牛嫋菜與絨毛芙蓉蘭交叉出現，偶見走向低海拔著生珊瑚樹，其葉緣有齒狀不同於珊瑚樹全緣。孟宗竹中亦栽種烏腳綠竹樹叢，竹節附著有柚葉藤及柃樹藤。2號雲林縣警告牌上方巨石海拔1255公尺，觀察巨石附著植物有臭節草(*Boenninghausenia albiflora*)，搓葉含有一股精油香味，是提振士氣忘掉拾階痛苦的良草。濕生石壁有馬藍、瓶蕨、川上氏堇菜、布勒德藤、青芋、火炭母草、全緣卷柏、倒地蜈蚣、



大葉楠

巒大秋海棠、冷清草、八角金盤小苗、珍珠蓮、落新婦、觀音座蓮、旋莢木等。

大尖山海拔1305公尺屬柳杉植物社會 ——

一等三角點編號56，基石右邊王義隆先生捐地，2014年11月20日陳明我等7兄弟捐建，由嘉義縣張花冠縣長立水泥牌，左邊則是凸出岩層，眺望前方草嶺隧道、石壁山、溪頭遊樂區之山巒。山頂栽種有茶樹、阿拉比咖啡、陰香，最大喬木是杜英胸寬109公分、柳杉100公分。地被植物有小花鼠刺、紅葉樹、紅楓、細枝柃木、大頭茶、廣東油桐、大葉溲疏、桔梗蘭、大武蜘蛛抱蛋、角花烏斂莓、糙莖菝葜、藤花椒、台灣懸鉤子、黑果馬廸兒、玉葉金花、台灣牛嫋菜及光葉魚藤。光葉魚藤(*Millettia nitida*)含魚藤酮毒性，但顯眼蝶形花冠，花瓣淡





從大尖山眺望玉山聖稜線

紅，旗瓣基部有黃斑。大葉蛇藤與南華南蛇藤各憑本事攀結樹冠上，外來的鳳仙花、虎耳草正拓展其領域。紅色木棧橋海拔1272公尺，右側眺望華山風景線，柳杉、孟宗竹、鵝掌柴、台灣懸鉤子、玉山紫金牛、裡白葉薯榔，偶見絞木科東瀛珊瑚。經過愛玉子攀附蓄水池，上面附著很多樹蛙泡泡，想必今年夏季茶園的交響樂一定此起彼落。續行紅楠與櫟樹的花青素嫩葉將嶺線點綴紅得發紫，炫目非凡。登上二尖山第二涼亭(曉爛亭)，視野一級棒，以王安石〈登飛來峰〉：「飛來山上千尋塔，聞說雞鳴見日昇。不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層。」亭腳撰寫「千般計較怎得快樂，心容萬物焉不幸福」，觀景台由左至右嶺線是杉林溪、清水溪草嶺九二一地震崩塌地、豐山、瑞峰村山頭的大塔山、玉山、阿里山的大凍山及太興村的四大天王山。近瞰龍眼村，昔時全村是山龍眼(*Helicia formosana*)故名，且為梅仔坑商旅重要店仔，2005年3月5日曾發生大雪覆蓋整片茶園，地理位居大尖山稜脈之東，是北港溪與清水溪分水嶺。

二尖山省政府圖根點遺失，海拔1279公



龍眼社區圖騰

尺。山頂有座門牌龍眼林32之20二尖休閒茶園，周遭植物有紫藤、法國莧、巴西鐵樹、風鈴木、扁桃斑鳩菊、珊瑚櫻、桂花、巴西野牡丹、裡白刺楳、陰香、月橘、龍柏、山櫻花、茄苳、牛樟、蒲桃、榕樹、茶花、香水合歡、西洋杜鵑、美人蕉。中心樹是蒲葵(*Livistona chinensis*)，又稱扇葉蒲葵，在龜山島有整片自然林，其裂縫深度約葉面2/3，若僅1/2-1/3則是圓葉蒲葵。第一座涼亭海拔1273公尺，右產道為4-2步道出口，左下車道前往龍興宮。茶園地被護坡植物川上氏堇菜、野牡丹葉冷水麻、普刺特草、黃鵪菜、倒地蜈蚣、菁芳草、鼠麴草和川上氏鴨舌疝，其最吸睛是6枚雄蕊，花絲被鏈珠狀毛，插在粉紅花被片上。右下最醒目建築是FM89.3新雲林之聲基地台紅色電線。樟

龍興宮



祝壽山茶園



苗栗崖爬藤、長葉腎蕨、領垂豆、玉山紫金牛、牛奶榕、紅楠、台灣肺形草、中國穿鞘花、燈籠花、粗齒鱗蓋蕨，偶見台灣百合在幽暗森林底層探尋綻放的契機。走出孟宗竹林，彷如電影場景，變成旖旎茶園風光，縱橫綠色波浪，當山嵐壟罩，好似仙女飄落人間畫卷。穿梭山徑，試比較金萱茶與烏龍茶何者葉較大、花較香？山巔豎立木頭是殘存柳杉，共有6株平均胸寬114公分。

梨子腳山海拔1176公尺，民國42年楊森將軍率眾登山慶祝蔣公壽誕，故又稱祝壽山。三等三角點228號小百岳第57，西邊有地下電台基

眺望嘉南平原





玉山灰木



金針花



尼泊爾蓼

地，孟宗竹為主，伴生有五節芒、裡白、野棉花、車前草、山櫻花、鵝掌柴、台灣芭蕉、台灣山桂花、姑婆芋、角花烏斂莓、三奈、射干菖蒲(觀音蘭)、金針花，若是野生金針，肯定是早期開墾山林種植農作物，後因故遷移花東地區，但每年5月，梅山橫山屏休閒園區及省道台三線267公里可就近欣賞黃澄澄花海。其它有刺茄、相思樹、玉葉金花、锈毛鐵線蓮、小葉桑、細葉饅頭果、絨毛芙蓉蘭、杜虹花等。

太平山海拔1082公尺屬孟宗竹林

三角點無基石，但有觀光局阿里山管理處93年9月編號Wn008銅標精導點和一座中華電信基地中繼台設備，左臨電信微波站，雖在近呎，卻因孟宗竹橫陳必須繞遠路。太平山三角點外圍是孟宗竹林，內圍是叢生五節芒和地毯草、火炭母草、粗毛小米菊、茅蘆、加拿大蓬、昭和草、紫花藿香薊、戟葉蓼、尼泊爾蓼、克非亞草、桔梗蘭、川上氏月桃。順著茶園可探頭看太平國小操場，直走往三元宮海拔983公尺，有紫藤廊道、九重葛花棚。折返取左

經樟湖大眾廟回華山4-2步道勒石休息亭，亭外植物檳榔林有杜英、冇骨消、朴樹、小梗木薑子、粉撲合歡、光臘樹、白匏子、龍眼、金絲竹、紅邊竹蕉、梅花、台灣山蘇、肖楠。朝4-1號步道龜仔頭、文化長廊前進。其一沈富進先生出版台語字典「彙音寶鑑」讓人「知字則知音，知音則知字」十五音法以45字母音，瞭解閩南語的意涵。最後以許鴻德先生「星夜」詠嘆華山好風光：「萬千星兒宇宙藏，北斗七星位上方，星夜晴空光點閃，十五猶見月亮單，美景夜色邊際廣，絕頂咖啡濃純香，華山風華名重揚，文學詩詞盡情賞。」

真柏 *Juniperus chinensis* var. *Sargentii* Henry
柏科，屬名 Juniperus 為 Celts 語 juneprus (粗糙)一語而來；或說由拉丁語的 Juvenis (年輕)與 pario (分娩) 締造而成，指本屬可應用墮胎劑利用而得。中名圓柏屬，以植株性狀形象名之。偃臥狀灌木，株高30–60公分，小枝斜上伸展，尖塔狀樹冠，展開達3公尺，樹幹及枝幹匍匐地面，樹皮深灰縱裂。葉呈2型，幼樹刺葉



華山文學路



眺望太平村

形，三葉交互輪生，老樹鱗形葉，葉長0.6–1.2公分，披針形，先端漸尖，葉上微凹，背面有2條氣孔帶。花單性花，雌雄異株，頂生，雄蕊花長圓形，花黃色，雄蕊4–8對，交互對生，雌蕊花4–8對交互對生或3枚輪生之珠鱗，成熟後成種鱗，肉質不開裂，胚珠1–6枚。球果圓球形，表面著生少許瘤狀，成熟時呈黑紫色，種子1–6枚呈黃色無翅。分布中國大陸東北張廣才嶺、日本、蘇俄；台灣於1960年引進，喜光，略耐蔭、耐寒性強，耐瘠薄岩縫生長。盆景繁殖用扁柏或側柏做砧木嫁接繁殖，利用鉛絲、麻皮，攀扎樹型，並利用刀削、剝樹皮，呈現斑剝舍利干模樣，達到自然界樹林長期遭受風雨雷電襲擊，樹枝劈斷，枝葉團簇下垂，虬曲狀，古雅奇特現象。

黃金檜

Chamaecyparis obtusa var. *filicoides*

或 var. *crispii*

柏科，屬名*Chamaecyparis*由希臘文chamai(低矮)和kuparisson(柏)締造而成，意指其為小果實的柏科植物。檜字古名，名見「詩經」李時珍曰：「柏葉松身者檜也，其葉尖硬亦謂之栝，今人名圓柏，以別側柏。」日本扁柏的園藝品種。樹型圓錐形，樹枝水平生長，小枝略下垂，十字對生鱗葉卵圓形或菱形，葉端鈍且肥厚，新葉黃綠色或黃色，老葉綠色，成株才會開花，栽培種罕見開花結果。原產於日本的日本扁柏，台灣於1896、1905、1970年分別引進，黃金檜則於1906及1951年引進。另常見栽培種有雲柏(var. *breviramea*)、雀柏(var. *filicoides*)、垂枝扁柏(var. *pendula*)。栽培不耐浸水，淺根性，萌蘖力強，耐修剪，可當綠籬、庭院全景樹、盆栽、花壇造景。

葶藶

Rorippa indica (L.) Hiern

十字花科，屬名*Rorippa*為該植物古代薩克遜語(東德)名稱rorippen締造而成，意指



喜生長在河岸、水田等潮濕地方。葶藶乍聽亭亭玉立，花姿形象。葶藶，古名，名見「神農本草經」卷16，釋名丁蘡(別錄)、葷蒿、大室(本經)、大適(本經)、狗薺(別錄)。多年生草本，全株光滑無毛，株高15–50公分，根生葉有柄，平鋪地面，倒披針形或長橢圓披針形，長5–15公分，羽狀中裂或鋸齒緣；莖生葉無柄，互生，披針形。總狀花序，一花具一短梗，花黃色，花序無苞片，萼片褐色，基部不呈囊狀，花瓣4枚呈十字形，雄蕊6枚，4枚較高，雌蕊1枚。長角果圓柱形，長約2公分，種子黃色細小。分布亞熱帶地區，台灣平野常見雜草，嫩葉可供食用，是紋白蝶、台灣紋白蝶的幼蟲食草。葶藶煎子代茶飲，配生魚、瘦肉、蜜棗煲湯，可清熱解喉乾。相似種小葶藶(*R. dubia*)葉長5–9公分，花瓣短缺，果長1.5–2.5公分；濕生葶藶(*R. palustris*)葉長6–20公分，羽片具有1–5對，花瓣黃色，長角果較短0.3–0.7公分，為中國廣東有名的涼茶之一，又稱葛菜子。

松葉*Sedum mexicanum* Britt**佛甲草**

景天科，屬名 *Sedum* 其為原拉丁文 *sedo*(坐，定棲)締造而成，意指本屬植物岩生樣貌。種名 *mexicanum* 指墨西哥，又稱墨西哥佛甲景、墨西哥景天。命名者納撒尼爾·布里頓爵士(Nathaniel Lord Britton, 1858–1934)美國植物學家和分類學家，在紐約布朗克斯共建紐約植物園。中名佛甲草，古名，名見〈本草綱目宋圖經〉卷20，李時珍曰：「夏開黃花經霜則枯，人多栽於石山瓦牆上呼為佛指甲。」多年生肉質草本，植株10–30公分，莖直立，葉線狀披針形，長0.5–2公分、寬0.3公分，先端漸尖，葉基楔形，不孕枝葉呈4枚，葉片輪生，受孕花枝則輪生與互生密集。聚繖花序，頂生，花多數，無花梗，苞片線形，花萼5枚，披針形不等長，花瓣5枚金黃色，雄蕊10枚，5長5短，內輪5枚與花瓣對生，花絲基部合生，心皮5枚。蓇葖果直立，種子不具有翼。分布於墨西哥及北美洲，園藝栽培逸出成歸化種。庭園花圃、地被綠化。

合歡*Albizia julibrissin* Durazz

豆科，屬名 *Albizia* 其為1749年將合歡引進栽培的義大利博物學者菲利利波·阿爾比齊(Flippe Degli Albizzi)用其姓氏締造而成；種名 *julibrissin* 為原產地之名，命名者為義大利的安東尼奧·弗朗西斯科·杜拉齊尼教授(Antonio Francesco Durazzini, 1740–1810)。合歡，古名，名見「本草綱目本經」卷35，釋名：「合昏(唐本)、夜合(日華)、青裳(圖經)、萌葛(綱目)，指小葉一到夜晚閉合在一



松葉佛甲草



松葉佛甲草

起，猶如男女交媾形象。落葉喬木，樹高10公尺，樹皮灰色，樹冠傘形擴展。二回羽狀複葉，羽片8–14枚，小葉20–50枚，長橢圓形呈鐮刀形長0.6公分、寬0.2公分，先端尖頭，基部圓形，葉柄腺體在葉柄中央處，托葉早落，總狀圓頭形頭狀花序，粉紅色盛開6–7月，花萼與花冠漏斗形，5齒裂，雄蕊多數，花絲長2公分，粉紅色基部合生為筒狀，子房短柄，柱頭頭狀。蓇葖果扁平，帶狀長13公分，光滑無毛，內有種子8–12枚。分布於熱帶亞洲及非洲，台灣多見於中海拔森林，常見於台17線思源壩口至梨山一帶，盛開期間不遜櫻花及桐花之美。合歡樹耐寒、耐熱，適宜推廣為行道樹；心材黃灰褐色，邊材黃白色，可製家具，但易裂開，需經處理。早期羅馬人以為蠶絲製品產於這種樹上，又稱為絲樹，嫩葉可食，老葉洗衣服，樹皮提煉天然表面活性劑，具有抗氧化、抗炎、抗菌作用。相似種楹樹(*A. chinensis*)二回羽狀複葉，羽片6–20枚，小葉12–45枚，線狀長橢圓形，長0.6–1.3公分、寬0.2–0.4公分。

宮粉梅*Prunus mume* Sieb. var. *Mume* f. *alphandii* (Carr.) Rehd.

薔薇科，屬名 *Prunus* 為古拉丁名 *pium* 衍用而得，又為 *Armeniaca* 梅屬。梅，古名，名見本草綱目卷29，李時珍曰：「梅乃杏類，故反杏為呆，書家訛為甘木。或云梅者，媒也，媒合眾味，故書云若作和羹，爾雅鹽梅。故梅入北方變為杏。」小喬木，稀灌木，小枝綠色光滑無毛。葉片卵形長7公分、寬6公分，先端尾尖，葉緣有鋸齒，柄長1公分具有腺體。花單生



合歡



合歡

完全花，香味濃，盛開2月，萼筒5裂，花重瓣以粉紅色為主，亦有白色，雄蕊40枚，著生於萼筒口四周，心皮1枚，柱頭1枚頂生。本種不易結核果。分布於中國大陸長江流域以南各省。花梅品種，據陳俊愉教授研究分為四大類：照水梅類(枝條下垂)、青游梅類(扭曲狀)、杏梅類(枝葉似山杏)及直腳梅類(枝條直立或斜展)；又分江梅型、大紅型、硃砂型、玉蝶型、綠萼型、灑金型及宮粉型，現知有75個品種，如宮粉、粉嘴子、千葉紅、南京春、粉妝台閣等。唐李億〈西山晚別〉：「曲盡江流換馬裘，美人梅下引風流。蘭舟未解朱顏緊，幽怨難辭釵鳳留。」

紅楓 *Acer palmatum 'Atropurpureum'*(Van Houtte) Schwerim

無患子科，屬名Acer為古拉丁名稱衍用稱之，含有銳利之意，因其木材堅硬，早期用來製造銳利長釘和長矛。種名Palmatum指葉掌狀之意。又名紅顏楓，是雞爪楓的變型。落葉小喬木，枝條細長，紫紅色。葉掌狀5-7深裂，直徑5-10公分，裂片卵狀披針形，先端尾狀尖，緣有重鋸齒。花頂生繖形花序，萼片4-5枚與花瓣同數，雄蕊4-10枚，通常8枚，著生在環狀花盤，子房上位2室2裂，花柱2枚。翅果。分布於浙江、安徽、江蘇、河南、江西、上海等地，朝鮮、日本亦有產。性喜濕潤、溫暖和涼爽環境較耐陰、耐寒，忌烈日曝曬，高溫乾燥生長。常見紅葉絢麗奪目品種有五小葉楓、五角楓(地錦槭)、雞爪楓、元寶楓(平基槭)、三角楓、茶條楓(華北茶條槭)、複葉楓(欒葉槭)、血皮楓、秀麗楓、紅翅楓、羽毛楓、春豔雞爪楓、夕佳雞爪楓、嶺南楓。

武藤 雲邊桂 *Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour. var. *semperflorens*

木犀科，屬名Osmanthus由希臘文osme(芳



香)與anthos(花)締造而成，意指芬芳花朵。桂花的桂字，源由「香桂花」其葉子之葉脈，形狀像「圭」字緣故。桂花木材細膩，紋路如犀牛角，故桂花又稱木犀。灌木，葉橢圓形，長7-13公分、寬2.6-4公分，先端漸尖，邊緣有細鋸齒，葉面皺，葉色呈白色在邊緣，綠色在中央不規則覆輪斑。聚繖花序，淡白色芳香，花萼、花冠4裂，裂片在花芽中呈覆瓦狀排列，雄蕊2枚，花絲短，子房2室。核果。原產中國大陸西南部，現各地廣泛栽培。雲邊桂屬基金突變四季桂類，四季桂別稱月月桂，特性生長勢較強，葉片薄，葉緣稀疏或全緣，花冠淡白微黃，芳香較淡，花朵稀疏。常見有月月桂、日香桂、大葉佛頂珠、齒葉四季桂等18種品種。全年觀葉，初期嫩葉紫紅，漸近轉為白色，中期漸轉成中間青、邊緣雲白，成熟期中間綠、邊緣雲白，桂葉富有層次轉色。是盆栽、造景最佳選擇。桂花做茶、糕點、香料，芳香醇厚，口感生香。