

台灣保育類鳥種選介 第二級珍貴稀有

整理／楊玉祥

陸鳥篇

上一期鳥語為大家選介了第二級「珍貴稀有」保育類鳥種的水鳥篇，本期將繼續介紹陸鳥篇，但因日行性猛禽及夜行性猛禽種類太過繁多，無法一一介紹，僅簡略說明如下：日行性猛禽：鷹形目鵟科、鷹科與隼形目隼科等日行性猛禽均為保育類，台灣共計有32種。其中，除鷹科的熊鷹(*Nisaetus nipalensis*)、林鵰(*Ictinaetus malayensis*)、白肩鵰(*Aquila heliaca*)、白尾海鵰(*Haliaeetus albicilla*)及隼科遊隼(*Falco peregrinus*)等5種為一級保育類外，其餘日行性猛禽均為二級保育類，如黑鳶、大冠鸞、鳳頭蒼鷹…等；夜行性猛禽：鷹形目草鴞科及鴟鴞科的貓頭鷹均是保育類，目前台灣有13種貓頭鷹，僅草鴞科的草鴞(*Tyto longimembris*)為一級保育類，其餘均為二級保育類，如領角鴞、黃魚鴞、褐鷹鴞…等。

小鶲鶉 *Coturnix chinensis* • Blue-breasted Quail • 雉科

- * 小型鶲鶉，體長約12cm，頭小身體圓胖，尾短，嘴鉛灰色，腳橙黃色。
- * 頭至背面暗黃色，雄鳥背面密布黃白色羽軸，臉至腹側藍色，頰有白色斑塊，邊緣及喉部黑色，腹部中央至尾下紅色。雌鳥背面似雄鳥，翼上褐色有淡色的斑點，眉線粗、褐色，臉至腹面褐色，喉部淡色，以下密布暗色橫紋。
- * 稀有留鳥，通常出現於平地林緣、草原等地帶。




母鳥・郭偉修 攝



公鳥・郭偉修 攝

黑長尾雉 *Syrmaticus mikado* • Mikado Pheasant • 雉科

- * 大型雉雞，雄鳥體長可達90cm，雌鳥約50cm，體型粗壯，嘴、腳鉛灰色。
- * 雄鳥全身大致為黑色有光澤、羽緣藍色，翼上有2道白色翼帶，尾甚長，尾羽有白色細橫斑，臉部裸皮紅色。雌鳥全身大致暗褐色，有許多白色斑點及蠹斑。
- * 又名帝雉，是台灣特有種，為稀有的留鳥，常單獨、成對或小群一起出現於中、高海拔的森林底層，有棲地減少及過度獵捕的壓力。



公鳥・王健得 攝



母鳥・王健得 攝

藍腹鷓 Lophura swinhoii · Swinhoe's Pheasant · 雉科

- * 大型雉雞，雄鳥體長可達70cm，雌鳥約55cm，體型粗壯，嘴鉛灰色，腳紅色。
- * 雄鳥尾甚長，全身大致為光澤的藍黑色，頭上冠羽、背羽及中央尾羽白色，肩羽暗紅褐色，飛羽黑色，臉部有大塊紅色裸皮，甚為明顯。雌鳥全身大致暗褐色，背面有蠹斑及褐色V形斑紋，初級、次級飛羽暗褐色有淡色橫紋，外側尾羽紅褐色，腹面有黑色細V形斑紋。
- * 台灣特有種，不普遍的留鳥，常單獨、成對或小群出現於中、低海拔森林底層，有棲地減少及過度獵捕的壓力。



母鳥 · 柯木村 攝



公鳥 · 王健得 攝

環頸雉 Phasianus colchicus · Ring-necked Pheasant · 雉科

- * 大型雉雞，雄鳥體長可達80cm，雌鳥60cm，體型粗壯。
- * 雄鳥嘴橙黃色，腳灰褐色，頭至頸暗綠色，頭頂褐色、後頭有冠羽，頸側至頸後有白色頸環，背面褐色有黑色縱斑，翼灰褐色，尾甚長、褐色有黑色橫紋，腹面紅褐色有鱗狀斑。雌鳥全身大致褐色，背面有許多暗色斑，尾較短、紅褐色有淡色橫紋，胸至腹中央淡褐色。
- * 台灣特有亞種，稀有留鳥也是平地唯一的大型雉雞，棲息於平地草原、農耕地及甘蔗田等地帶，因引進外來亞種雉雞與原生族群有雜交現象，再加上西部平原開發而造成棲息地消失並有獵捕壓力。



母鳥 · 簡廷謀 攝



公鳥 · 王健得 攝

黑鳶 Milvus migrans · Black Kite · 鷹科

- * 中型猛禽，體長約55cm，全身大致暗褐色、羽緣淡褐色，頭部、腹面有淡色縱斑。
- * 飛行時，翼方形而長，向後掠，有6根飛指略長，尾羽長，中央凹且張開時後緣平直。
- * 稀有的留鳥，主要棲息於平地至低海拔森林，可長途飛行至溪床、河口、魚塭等地帶覓食，族群稀少，再加上棲地破壞、開發壓力大；近年來調查，更發現因常檢食動物屍體而遭到農藥及鼠藥危害。



陳世明 攝



柯木村 攝

褐鷹鴟 *Ninox japonica* • Northern Boobook • 鳩鴟科

- * 小型貓頭鷹，體長約22–28cm，虹膜黃色，頭至上胸、背部大致褐色，尾有橫紋，腹面淡色，有粗縱斑。
- * 有過境鳥及繁殖留鳥二個不同族群，族群數量並不普遍，再加上棲地破壞及捕獵壓力等，因而名列於二級保育類。



王健得 攝

紅頭綠鳩 *Treron formosae* • Whistling Green-Pigeon • 鳩鴿科

- * 大型鳩鴿，體長約33cm，嘴藍灰色，腳粉紅色。
- * 雄鳥，全身大致綠色，額至頭頂橙色，臉至前胸略帶黃綠色，中、小覆羽紫紅色，飛羽黑色，下腹部至尾下覆羽淡色有暗色斑點。雌鳥全身綠色，尾下覆羽淡色有暗色斑點。
- * 台灣特有亞種，為稀有的留鳥，主要分布於南台灣及東部、蘭嶼平地至低海拔林緣，族群稀少且有易遭人為干擾的壓力。



李文化 攝

大赤啄木 *Dendrocopos leucotos* • White-backed Woodpecker • 啄木鳥科

- * 體長約25cm，雄鳥頭頂紅色，後頸至背面大致黑色，飛羽及尾羽有白色細斑點，腰白色雜有黑色斑紋，臉至腹面淡，嘴基至頰、頸側有黑色花紋，胸、腹部有黑色細縱斑，下腹至尾下覆羽紅色；雌鳥頭頂黑色。
- * 台灣特有亞種，為不普遍的留鳥，族群稀少且有棲地過度開發、植物相改變或伐木造成築巢所需大型枯木缺乏。



王健得 攝

綠啄木 *Picus canus* • Gray-faced Woodpecker • 啄木鳥科

- * 體長約25cm，頭灰色，雄鳥額至頭頂紅色，頭頂至後頭有黑色細縱紋，全身大致橄欖綠，初級飛羽、外側尾羽黑色，有白色細斑點；雌鳥額至頭頂非紅色。
- * 台灣特有亞種，為稀有的留鳥，族群稀少且有棲地過度開發、植物相改變或伐木造成築巢所需大型枯木缺乏。



公鳥・張健樂 攝

母鳥・沈炳雄 攝

八色鳥 *Pitta nymphal* · Fairy Pitta · 八色鳥科

- * 體長約18cm，嘴黑色、粗短，腳黃褐色。
- * 頭上褐色，頭央線及眼線黑色，眉、頰以下至腹側黃色，背大致綠色，翼前緣亮藍色，初級飛羽黑色有白色斑塊，尾短、藍色有一黑色橫紋，腹中央至尾下紅色。
- * 不普遍的夏候鳥，繁殖於台灣低海拔丘陵、山區的森林，喜食蚯蚓，常活動於底層，族群稀少且有獵捕壓力，棲息地破壞、減少的壓力甚大。



柯木村 摄

花翅山椒鳥 *Coracina macei* · Large Cuckooshrike · 山椒鳥科

- * 體長約30cm，體型壯，嘴短、黑色，腳黑色。
- * 全身大致灰色，腹面較淡，尾下白色，雄鳥臉前半至喉黑色，飛羽及尾羽黑色、末端白色；雌鳥臉灰色。
- * 稀有的留鳥，分布於中、低海拔森林中，族群稀少。



柯木村 摄

朱鷺 *Oriolus traillii* · Maroon Oriole · 黃鸝科

- * 體長約27cm，體型壯，嘴、腳鉛藍色，眼淡色。
- * 雄鳥頭至頸、飛羽黑色，其餘紅色；雌鳥身上腹面淡色有縱斑。
- * 台灣特有亞種，為不普遍的留鳥，分布於平地至低海拔森林，面臨棲息地破壞、減少以及很大的獵捕壓力。



公鳥·李文化 摄



母鳥·陳世明 摄

紫綬帶 *Terpsiphone atrocaudata* · Japanese Paradise-Flycatcher · 王鶲科

- * 嘴、腳鉛藍色。雄鳥體長約35cm，繁殖羽中央尾羽甚長，體型可達45cm，眼深色、眼圈藍色甚明顯，頭至胸黑色，背部暗紫色有光澤，翼及尾羽黑色，腹以下白色。雌鳥尾較短，體長約18cm，羽色較黯，背大致紅褐色，眼圈較不明顯。
- * 稀有的過境鳥，族群稀少且面臨獵捕及棲地開發壓力。



母鳥·王健得 摄



公鳥·王健得 摄

黃山雀 *Parus holsti* • Yellow Tit • 山雀科

- * 體長約13cm，嘴、腳黑色。
- * 頭上半黑色，有長冠羽、後緣白色，背面藍黑色，臉至腹面黃色，雄鳥有黑色臀斑，雌鳥無。
- * 台灣特有種，為稀有留鳥，分布於中、低海拔森林，族群稀少，有獵捕壓力。

李文化 攝



赤腹山雀 *Poecile varius* • Varied Tit • 山雀科

- * 體長約11cm，嘴、腳黑色。
- * 頭上半、喉黑色，頭頂至後頸有白色央線，背面藍灰色，胸腹栗褐色。
- * 台灣特有亞種，為不普遍留鳥，族群不連續地分布於中、低海拔森林，族群稀少、分布侷限且有獵捕壓力。

王健得 攝



烏頭翁 *Pycnonotus taivanus* • Styan's Bulbul • 鶲科

- * 體長約18cm，嘴、腳黑色。
- * 額至後頭、頸線黑色，身體灰色、腹面較淡，翼、尾橄欖綠色，眼周圍淺灰色，嘴基有1橘色斑點，耳羽至喉部白色。
- * 台灣特有種，為局部普遍的留鳥，分布於西半部屏東楓港以南至東部地區，分布十分侷限，因白頭翁入侵其分布區，而面臨雜交威脅。

李文化 攝



大陸畫眉 *Garrulax canorus* • Hwamei • 噪眉科

台灣畫眉 *Garrulax taewanus* • Taiwan Hwamei • 噪眉科

- * 大陸畫眉體長約28cm，嘴、腳黃褐色，全身栗褐色，眼圈及眼線白色甚明顯，為引進種，並已在某些地區變成入侵種，與台灣特有種台灣畫眉雜交。
- * 台灣畫眉全身大致為褐色，頭至頸、胸有許多黑色細縱紋，主要分布於低海拔丘陵、山區森林或灌叢中。
- * 兩者均因為獵捕壓力而列入二級保育。

台灣畫眉・李文化 攝



大陸畫眉・陳世明 攝

台灣白喉噪眉 *Ianthocincla ruficeps* · Rufous-crowned Laughingthrush · 噪眉科

- * 體長約28cm，嘴黑色，腳灰褐色。
- * 額至後頭栗色，眼先黑色，喉至上胸白色甚明顯，體大致褐色、腹面較淡，外側尾羽末端白色。
- * 台灣特有種，為稀有留鳥，分布於中海拔森林底層，面臨獵捕及棲息地破壞、減少等壓力。

陳世明 攝



棕噪眉 *Ianthocincla poecilorhyncha* · Rusty Laughingthrush · 噪眉科

- * 體長約28cm，嘴黃色、嘴基藍色，腳藍灰色。
- * 背面至胸栗褐色、以下灰色，眼圈、周圍藍色。
- * 台灣特有種，為不普遍留鳥，分布於中海拔森林底層，因屬大型畫眉而面臨獵捕壓力。

王健得 攝



小剪尾 *Enicurus scouleri* · Little Forktail · 燕科

- * 體長約12cm，嘴黑色，腳粉色。
- * 背面至胸黑色、額至眼上方，翼帶、腰至外側尾羽白色明顯，腹至尾下白色，腹側有黑色斑紋。
- * 台灣特有亞種，為稀有留鳥，主要分布於山區溪澗環境之中，族群稀少，野溪整治、林地開發導致棲息地減少，高山農耕污染水質影響其生態。

陳侯孟 攝



王健得 攝

白頭鶲 *Turdus poliocephalus* · Island Thrush · 鶲科

- * 體長約22cm，嘴、腳橘黃色。
- * 雄鳥頭至頸白色，背面灰黑色，腹面栗褐色；雌鳥頭頂至背面暗褐色，眉線粗、白色，臉淡色有許多褐色斑紋。
- * 台灣特有亞種，為稀有留鳥，分布於中、高海拔樹林，族群稀少且有棲地破壞、減少的壓力。

李文化 攝



李文化 攝

八哥

Acridotheres cristatellus • Crested Myna • 八哥科

- * 體長約25cm，體型粗壯，全身大致黑色。
- * 嘴象牙白，基部上方冠羽明顯，眼栗褐色，初級飛羽中段白色形成一個大型斑塊，尾下覆羽及外側尾羽末端白色。
- * 台灣特有亞種，為不普遍的留鳥，分布於平原農耕地帶，族群稀少，有獵捕壓力並面臨外來入侵種白尾八哥、家八哥等鳥種之競爭壓力。

朱海文 攝



野鶲

Emberiza sulphurata • Yellow Bunting • 鶲科

- * 體長14cm，雄鳥頭綠色，眼圈白色明顯，背面褐色有黑色斑紋，腹面大致黃綠色，腹側有縱斑。
- * 雌鳥羽色較淡，眼圈較不明顯。
- * 稀有過境鳥，族群稀少。



左圖：母鳥・柯木村 攝 右圖：公鳥・簡廷謀 攝

嚴重瀕臨滅絕的新訪客 白鶴

Leucogeranus leucogeranus • Siberian Crane • 鶴科

2014年12月10日，民眾於彭佳嶼發現一隻黃白相間的大鳥，經詢問之後，竟然是臺灣新紀錄種「白鶴」的亞成鳥。三日後，這隻白鶴離開彭佳嶼，飛抵臺灣本島，連續兩天假日吸引兩百餘位鳥友到訪觀賞拍攝。然而，這隻首次到訪臺灣的小客人，牠的族群正處於嚴重瀕臨滅絕的險境。希望在臺灣停留的這段期間，能夠獲得友善的對待，平安地結束遷徙旅程，回到北方的繁殖地。

全世界鶴科(Gruidae)鳥類有15種，白鶴是最為瀕臨滅絕的一種。除了黑色的嘴喙、紅色的顏面、粉紅色的雙腳，以及展開翅膀時才看得到的黑色初級飛羽，其餘全身皆披覆雪白色的羽毛，因此也被稱為西伯利亞白鶴(Siberian White Crane)和雪鶴(Snow Crane)。白鶴雄鳥和雌鳥的外形相同，幼鳥的羽色則主要為黃褐色和白色。

目前白鶴在國際自然保護聯盟瀕危物種紅皮書(The IUCN Red List of Threatened Species)的保育等級列為「嚴重瀕臨滅絕」，臺灣的「保育類野生動物名錄」則列為第一級「瀕臨絕種野生動物」。其他關於白鶴的詳細知識請參考林大利先生於PanSci的文章 <http://pansci.tw/archives/72541>



白鶴・柯木村 攝